

Flemingia strobilifera

čeleď: Fabaceae

oblasti: Bhútán, Filipíny, Jamajka, Jáva, JV Čína, Kašmír, Laos, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Nová Kaledonie, Panama, Paňdžáb (pakistánský), Papua-Nová Guinea, Sikkim, Sindh, Srí Lanka, Tchaj-wan, Thajsko, V Afrika, Vietnam, Yunnan

Roste v tropické Asii v podobě vzpřímeného až poléhavého keře, zavlečen byl do střední Ameriky a východní Afriky. Dorůstá výšky (0,3 -) 1,5 - 2 (i 3)m. Borka je hnědá nebo našedlá a ochlupená. Palisty jsou kopinaté až čárkovité, dlouhé 0,8 - 1,8cm a záhy opadávají. Listy jsou vejčité, eliptické nebo kopinaté, mohou být i asymetrické, špičaté až zašpičatělé, zvlněné, dlouhé (6 -) 7,5 - 15cm, široké (2,5 -) 3 - 6,5 (i 7)cm, báze zakulacená až mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek, řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm a řídce ochlupené. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholový hrozen délky 5 - 15cm, listeny jsou bledězelené (i narůžovofialové), kulaté až vejčité, ochlupené, dlouhé 1,2 - 2,5 (i 3)cm, široké 2 - 4,4cm, vlastní květy jsou drobné, schované v listenech, mají 1,5 - 3mm stopku, kalich zelený, dlouhý 4 - 5mm, cípy zakulacené, ochlupené, koruna je dlouhá (0,6 -) 0,7 - 0,9 (i 1)cm, bílá, pavéza kulatá a křídla jsou užší člunku. Plodem je ochlupený nafouklý ochlupený lusk délky (0,7 -) 0,8 -0,9 (i 1)cm, šířky 4 - 5mm a obsahuje 2 prakticky kulatá tmavěhnědá semena.

Vyhovují mu suché pastviny, příkopy, atp. v polostínu (i plném slunci) a to až invazivně.

<https://www.rostliny.net/>