

Hymenopappus filifolius

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kalifornský záliv sever, Kansas, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Washington, Wyoming

Roste v Severní Americe v podobě polokeře. Dorůstá výšky do 1m. Prakticky všechny listy jsou umístěné na bázi, jsou ochlupené, dlouhé do 20cm a dělené na lístkové. Květenství tvoří úbory ze žlutých nebo bílých terčových květů bez okvětních lístků. Existují vnitrodruhové taxony:<div>

- var. eriopodus - Kalifornie, Nevada, Utah; květy bílé
 - var. filifolius - Idaho, Oregon, Washington
 - var. idahoensis - Idaho
 - var. lugens - Arizona, Kalifornie, Nevada, Utah, Nové Mexiko, Kalifornský záliv
 - var. luteus - Utah, Wyoming, Kolorado
 - var. megacephalus - Kalifornia, Nevada, Utah, Arizona, Kolorado
 - var. nanus - Arizona, Kalifornie, Nevada, Utah
 - var. nudipes - Utah, Wyoming
 - var. parvulus - Kolorado
 - var. pauciflorus - Utah, Arizona, Kolorado
 - var. polycephalus - Alberta, Saskatchewan, Kolorado, Kansas, Montana, Nebraska, Severní Dakota, Jižní Dakota, Wyoming
 - var. tomentosus - Utah
- </div>

<https://www.rostliny.net/>