

Garuga pinnata

čeleď: Burseraceae

oblasti: Bangladéš, Čína, Filipíny, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar (Barma), Pákistán, Sikkim, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Bangladéši, Kambodži, Indii, Myanmaru, Laosu, Filipínách, Pakistánu, Thajsku a Vietnamu v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 10 (i 15)m. Borka je šedohnědá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, dlouhé 15 - 45cm, tvořené 9 - 23mi vstřícnými lístky, nejspodnější jsou palistovité, dlouhé 0,5 - 1cm, střední lístky jsou eliptické, podlouhlé nebo kopinaté, řídce pilovité, zpravidla zašpičatělé, obvykle ochlupené, dlouhé 5 - 10 (i 11)cm, široké 2 - 3 (i 4)cm, báze zakulacená (i zkoseně klínovitá), žilnatinu tvoří 10 - 15 párů žilek, řapíčky jsou dlouhé max. 4mm a vrcholový je dlouhý 0,5 - 1cm. Květenstvím je úžlabní lata délky 7 - 22cm, vlastní květy mají 1 - 3mm stopku, jsou bílé, nažloutlé nebo nazelenalé, velikosti 0,7 - 1cm, kališní lístky jsou vně ochlupené, vejčité zubaté, dlouhé 2,5 - 4 (i 6)mm, korunní lístky jsou podlouhlé, vně ochlupené, dlouhé 5 - 6 (i 8)mm a široké 1,5 - 2mm. Plodem je kulovitá žlutá peckovice délky 1,1 - 2,3cm a šířky 0,9 - 2,3cm.

<https://www.rostliny.net/>