

## Vicia cassubica (Vikev kašubská)

synonyma: *Ervum cassubicum*, *Vicia dadianorum*, *Vicia monosperma*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Asie, Česká republika, Itálie, Německo, Polsko, Slovensko

Roste v mírném pásu Euroasie. Patří mezi víceletky. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Povrch bývá odstále ochlupený. Lodyha má čtvercový průřez, je poléhavá, příležitostně vystoupavá nebo popínavá a dorůstá délky 0,3 - 0,6 (i 1)m. Sudozpeřené 5 - 13cm dlouhé úponkou zakončené oboustranně lesklé listy tvoří 8 - 12 (i 15) párů dlouze vejčitých listů o šířce 0,3 - 0,8 (i 1)cm. Žilky svírají úhel se střední žilkou 45 - 60°. Kvete červenofialovými až růžovofialovými květy s 2 - 3mm dlouhými stopkami ve skupinách (5 -) 8 - 15ks na jednostranném hroznu umístěným v paždí listů. Koruna má délku 1cm a pavéza je tmavě žilkovaná. Plodem je plochý široce eliptický až kosočtvercový světlerezavý či červenofialový lusk délky do 3cm, šířky do 1cm s 1 - 2 (i 3)mi semeny. Patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyhovují ji světlé lesy, okraje, křoviny, stráně, vinice a sady atp. s dostatkem tepla, smíšené nebo listnaté lesy nebo bory.

<https://www.rostliny.net/>