

Vicia sativa (Vikev setá)

synonyma: *Vicia bacla*, *Vicia communis*, *Vicia cornigera*, *Vicia cosentini*, *Vicia cuneata*, *Vicia erythrosperma*, *Vicia glabra*, *Vicia globosa*, *Vicia intermedia*, *Vicia leucosperma*, *Vicia maculata*, *Vicia melanosperma*, *Vicia morisiana*, *Vicia nemoralis*, *Vicia notota*, *Vicia pallida*, *Vicia pimpinelloides*, *V. subsp. obovata*, *V. subsp. sativa*, *V. subsp. terana*, *Vicia terana*, *Vicia vulgaris*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Egypt, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Rusko, Západní Virginie

Roste ve středozemí jako jednoletka. Stonek je 4hranný, často ochlupený, dorůstá délky (0,8 -) 1 - 2m a může být ve spodní části větvený. Sudozpeřené listy délky 3,3 - 9cm tvoří (1 -) 4 - 7 (i 8) páru čárkovitých nebo úzce kopinatých lístků délky (0,8 -) 1,5 - 2,5 (i 3,5)cm a šířky 0,2 - 1,4 (i 1,6)cm. Pyskaté krátce stopkaté květy mají červenofialovou až růžovofialovou barvu, kalich délky (1 -) 1,1 - 1,8cm s délkou koruny 1 - 3cm. Mohou se vyskytovat samostatně nebo v hroznech. Plodem je zaškrcovaný hnědý holý nebo krátce ochlupený lusk délky (2,5 -) 3,5 - 6,5 (i 7)cm, šířky 6 - 9,5mm s ochlupením. Obsahuje (4 -) 5 - 8 (i 12) kulových smáčknutých semen v barvě červené, hnědé nebo žluté. Využívá se jako pícnina. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *abyssinica*
- subsp. *amphicarpa*/*V. amphicarpa* - výška 40cm; listy dlouhé 1,5 - 4,2cm, tvořené 3 - 6ti páry lístků, lístky dlouhé 0,6 - 2,2cm, široké 1 - 6mm; květy mají kalich délky 0,7 - 1,2cm; lusky dlouhé 3,1 - 4,6cm, široké 4 - 6,5mm, obsahují 6 - 15 semen
- subsp. *consobrina*
- subsp. *cordata*/var. *cordata*
- subsp. *incisa*
- subsp. *macrocarpa*/*V. macrocarpa*
- subsp. *nigra*/subsp. *angustifolia*/var. *angustifolia*/subsp. *consobrina*/subsp. *cordata*/subsp. *cuneata*/subsp. *heterophylla*/var. *minor*/var. *nigra*/*V. segetalis*
- var. *platysperma*
- subsp. *sativa*/var. *sativa*/var. *linearis*/subsp. *notata*
- subsp. *segetalis*

Vyhovují ji úhory, násypy, okraje cest, křoviny, atp. ve vlhké (dokáže růst i v suché) hlinité nebo písčité vápenité i nevápenité půdě.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>