

Vicia sepium (Vikev plotní)

synonyma: *Vicia basilei*, *Vicioides sepium*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Alpy, Česká republika, Grónsko, Irsko, Itálie, Katalánsko, Maine, Michigan, Německo, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rakousko, Švýcarsko, Vermont, Západní Virginie

Roste v Evropě až do výšek 2000m jako víceletka. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1)m. Pod zemí vytváří hluboce kořenující oddenek. Lodyha má čtvercový průřez, může být už ve spodní části větvená a je poléhavá nebo popínavá, když má patřičnou oporu. Dorůstá délky 30 - 50 (i 60)cm a může být řídce ochlupená. Sudozpeřené 5 - 10cm dlouhé listy s rozvětveným úponkovým zakončením se skládají ze 4 - 8 párů vejčitých až kopinatých lístků s vykrojenými vršky, vyniklou žilnatinou a spodní stranou krátce ochlupenou. Kvete špinavě modrofialovými (i bílými nebo nažloutlými) květy v paždí listů v chudokvětém 2 - 5tičetném krátce stopkatém květenství. Koruna bývá dlouhá 1 - 1,5cm. Plodem je podlouhlý holý nebo řídce chlupatý černý lusk délky 2 - 3,5cm. Využívá se jako pícnina. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *ericalyx*
- var. *montana*
- var. *sepium*

Vyhovuje jí plné slunce nebo polostín a vlhčí hlinitopísčité až jílovité dusíkaté půdy na okrajích cest, na loukách, listnatých i smíšených lesích, atp.

<https://www.rostliny.net/>