

Vicia villosa (Vikev huňatá)

synonyma: *Vicia boissieri*, *Vicia elegans*, *Vicia elegantissima*, *Vicia glabrescens*, *Vicia godronii*, *Vicia littoralis*, *Vicia plumosa*, *Vicia polyphylla*, *Vicia reuteriana*, *V. var. glabrescens*, *Vicia vulcanica*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Delaware, Egypt, Estonsko, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Litva, Louisiana, Maďarsko, Maine, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v východním středozemí a západní Asii jako jednoletka nebo dvouletka. Dorůstá délky 0,3 - 0,6 (i 1,3)m. Povrch je hustě ochlupený. Lodyha má hranatý průřez, je větvená již od spodní části. Sudozpeřené listy s úponkovým zakončením mají vejčité tvarované lístky s tuhým ochlupením v 5 - 12 párech, jsou úzké, dlouhé 1,5 - 2,5cm. Květy světle nebo i sytě modrofialovými (i bělavými) květy velikosti 1,5 - 2cm v jednostranném 12 - 30tičetném hroznu, kalichy jsou nafouklé. Plodem je lusk délky 2 - 4cm, šířky 1cm s 1 - 4mi černohnědými semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *ambigua*/subsp. *elegantissima*/subsp. *pseudocracca* - délka 60cm; listy dlouhé 2,2 - 7cm, tvořené 3 - 8mi páry lístků délky 0,7 - 3cm a šířky 1,2 - 7mm; květenství (1 -) 3 - 10tičetné, květy mají kalich délky 5 - 7mm; lusk délky 2,5 - 4cm, šířky 6 - 9mm, obsahuje 3 - 6 semen délky 2,3 - 4mm
- subsp. *eriocarpa* - délka 70cm; listy dlouhé 2,2 - 4,5cm, tvoří je 4 - 7 párů lístků délky 0,6 - 2cm, šířky 1 - 5mm; květenství 4 - 15tičetné, květy mají kalich délky 5 - 6,5mm; lusk dlouhý 2,5 - 3,5cm, široký 7 - 9mm, obsahuje 2 - 5 semen délky 3,5mm
- subsp. *microphylla*/V. *microphylla*
- subsp. *pseudocracca*
- subsp. *triflora*
- subsp. *varia* (Vikev huňatá olýsalá) - skoro holá lodyha; stopky květenství dlouhé 4 - 6 (i 9)cm; krátké hrozny s květy kvetoucími naráz
- subsp. *villosa*/V. *eriocarpa* (Vikev huňatá pravá) - hustě ochlupené; stopky květenství dlouhé 5 - 13 (i 17)cm

Vyhovují jí stráně, louky, paseky, okraje lesů, písčiny, křoviny, atp. v teple a sušších písčitých až hlinitých půdách. Patří mezi medonosné rostliny.

<https://www.rostliny.net/>