

Hiptage benghalensis (Jinokřídlice hroznatá)

čeleď: Malpighiaceae

oblasti: Filipíny, Florida, Havajské ostrovy, Indie, J Čína, Malajsie, Myanmar (Barma), Pákistán, Queensland, Srí Lanka, Sumatra, Tchaj-wan

Pochází z oblasti jihovýchodní a jižní Asie, objevuje se ale i v Austrálii, tichomoří a Floridě v podobě keře nebo dřevité liány. Dorůstá délky až 10 (i 30)m. Listy jsou eliptické až kopinaté, zašpičatělé, kožovité, v mládí růžové až červené, později zelené, dlouhé (8 -) 9 - 15 (i 20)cm, široké (2,5 -) 4 - 9 (i 10)cm, báze je klínovitá až zakulacená, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je úžlabní nebo vrcholové, hroznovité, ochlupené, dlouhé 5 - 15 (i 35)cm, listeny úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 2 - 5mm, vlastní květy jsou aromatické, průměru 1 - 1,5 (i 2,5)cm, stopky jsou dlouhé 0,7 - 2 (za plodu i 3)cm, kališní lístky eliptické nebo vejčité, ochlupené, dlouhé (2 -) 5 - 6 (i 8)mm, široké 1,5 - 4,5mm, korunní lístky jsou kulaté až eliptické, na okraji třásnitě, bílé na bázi se žlutou nebo růžovou skvrnou, dlouhé (0,3 -) 0,8 - 1,2 (i 1,5)cm, široké (0,2 -) 0,5 - 1cm, mají 10 tyčinek s 1 delší (0,8 - 1,2cm). Plodem je 3křídla nažka se středním delším křídlem délky až 5cm, ostatní mají 1/2 délku. Dokáže být invazivní. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *benghalensis* - listy dlouhé 9 - 18cm, široké 3 - 7cm; květy mají 1 - 2cm stopku
- var. *tonkinensis*/H. *madablota* var. *tonkinensis* - listy dlouhé do 20cm a široké 9cm

Vyskytuje se na okrajích lesů, na pobřeží i v horách.

<https://www.rostliny.net/>