

Holboellia latifolia

čeleď: Lardizabalaceae

oblasti: Bhútán, Čína, Himálaj, Nepál, Pákistán, Sikkim

Roste v Himálaji, Číně, Bhútánu, Indii a Nepálu v podobě popínavého keře. Dorůstá výšky 3 - 5m při průměru kmene do 10 (i 15)cm. Borka je ve stáří korkovitá. Mladé stonky jsou světle šedomodré. Listy jsou 3 - 5 (i 9ti)četné, řapíky dlouhé 4 - 8cm, lístky jsou úzce vejčité, zašpičaté až ocasovité, mohou být kožovité, tmavězelené, lesklé, dlouhé 4 - 10 (i 13)cm, široké (1 -) 1,5 - 5 (i 7)cm, báze je zakulacená až široce klínovitá (i mírně uťatá), spodní strana světlezelená a řapíčky jsou dlouhé 2 - 4cm. Květenstvím je 3 - 7mikvětý hrozen délky 3 - 12cm, kališní lístky jsou eliptické nebo vejčité, zelené nebo růžovofialové, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 3 - 5 (i 6)mm, u samičích bývají širší, samičí mají úzce eliptické plodolisty délky 0,8 - 1cm a koruna je zvonkovitá. Plodem jsou růžovofialové jedlé bobule délky 5 - 10cm, šířky 2,5cm a obsahují tmavá lesklá mírně zploštělá semena délky 8mm a šířky 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *angustifolia* - 7 - 9ks užších lístků

- subsp. *chartacea* - Čína, Bhútán, Sikkim; 3 - 7 lístků, lístky eliptické, vejčité nebo úzce obvejčité, špičaté, dlouhé 5 - 11cm, široké 2,5 - 7cm, báze zakulacená až široce klínovitá

- subsp. *latifolia*/var. *latifolia*/H. *ovatifoliolata*/Stautonia *latifolia* - Čína, Bhútán, Nepál, Sikkim; 3 (i 9) lístků, lístky vejčití, podlouhlé nebo vejčitě kopinaté, špičaté, kožovité, dlouhé 4 - 13cm, široké 1 - 5cm, báze klínovitá

<https://www.rostliny.net/>