

Senegalia (Kapinice)

čeleď: Fabaceae

Roste v tropech a subtropech Austrálie, Asie a Ameriky v podobě keře, popínavky nebo stromu. Listy jsou 2x zpeřené a řapíky mívají žlázu. Květenstvím je hlávka, klas (i hrozen), vlastní květy jsou bílé nebo žluté, kalich bývá 5tzubý až 5tilaločný, koruna bývá 5tilaločná. Plodem je zploštělý zpravidla tenký lusk.

Senegalia alemquerensis

Senegalia altiscandens

Senegalia amazonica

Senegalia angustissima

Senegalia bahiensis

Senegalia bonariensis

Senegalia caffra

oblasti: Botswana, Kapsko, KwaZulu-Natal, Mosambik, Svazijsko, Transvaal, Zimbabwe

Roste v jižní Africe.

Senegalia catechu (Kapinice katechová)

oblasti: Austrálie, Indie, Myanmar (Barma), Thajsko, Yunnan

Roste v Indii, Číně, Myanmu, Thajsku a Austrálii.

Senegalia catharinensis

Senegalia emilioana

Senegalia etilis

oblasti: Argentina, Bolívie

Roste v Argentině a Bolívii.

Senegalia feddeana

Senegalia ferruginea

oblasti: Indie, Srí Lanka

Roste v Indii a Srí Lance.

Senegalia giganticarpa

Senegalia gilliesii

Senegalia globosa

Senegalia grandisiliqua

Senegalia grandistipula

Senegalia guadalupensis

oblasti: Karibik

Roste na Malých Antilách v podobě vysoko šplhající ostnité popínavky. Listy jsou 2x zpeřené, tvořené 7 - 9ti primárními páry, 15 - 20ti sekundárními páry, vlastní lístky jsou úzce podlouhlé, zašpičatělé nebo tupé, dlouhé 0,6 - 1,4cm a široké 1,5 - 2,5mm. Květenství je latnaté, tvořené hlávkami, vlastní květy mají ochlupený kalich i korunu. Plodem je podlouhlý špičatý nebo zašpičatělý stopkatý lusk délky 10 - 13cm, šířky 2cm a báze je klínovitá.

Senegalia hirsuta

Senegalia huberi

Senegalia iguana

oblasti: Mexiko

Roste na západním pobřeží Mexika v podobě šplhavého keře. Výhony jsou v mládí plstnaté a opatřené krátkými zahnutými ostny. Listy jsou 2x zpeřené, tvořené 6 - 8mi primárními páry, 15 - 25ti sekundárními, vlastní lístky jsou špičaté, na spodní straně světlé, ochlupené, centrální žilka excentrická a řapíky jsou ostnité s velkou žlázou na bázi. Květenství je latnaté, tvořené hustými

klasy délky 4 - 5cm, vlastní květy mají ochlupený hranatý kalich délky 2,5mm a koruna je dlouhá 4 - 5mm.

Senegalia kallunkiae

Senegalia kelloggiana

Senegalia klugii

Senegalia kuhlmannii

Senegalia lacerans

Senegalia langsdorffii

Senegalia lasiophylla

Senegalia loretensis

Senegalia lowei

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Senegalia macbridei

Senegalia magnibracteosa

Senegalia martii

Senegalia martiusiana

Senegalia matogrossensis

Senegalia miersii

Senegalia mikanii

Senegalia modesta

oblasti: Afganistán, Indie, Pákistán

Roste v Afganistánu, Pakistánu a Indii v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Borka je hnědá až šedozelená. Plodem je lusk obsahující 3 - 5 semen.

Senegalia monacantha

Senegalia multipinnata

Senegalia nigrescens

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Z Afrika

Roste od západní Afriky po JAR v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky do 18m.

Senegalia nitidifolia

Senegalia olivensana

Senegalia paraensis

Senegalia parviceps

Senegalia pedicellata

Senegalia piauhiensis

Senegalia piptadenioides

Senegalia podadenia

Senegalia polyphylla

Senegalia praecox

Senegalia pteridifolia

Senegalia quadriglandulosa

Senegalia recurva

Senegalia rhytidocarpa

Senegalia riparia

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku v podobě popínavky. Kmínky jsou 4hranné, široké 2,5 - 5cm, šplhavé a mladé větve ochlupené a ostnitě. Listy jsou 2x zpeřené, tvořené 10 - 15ti primárními páry, 20 - 30ti sekundárními, vlastní lístky jsou čárkovité, dlouhé 5 - 6mm a spodní strana je síťnatě žilkovaná. Květenstvím je hlávka a vlastní květy jsou drobně ochlupené. Plodem je podlouhlý stopkatý ochlupený lusk délky 12cm a šířky 1,8 - 2,5cm.

Senegalia rostrata

Senegalia rurenabaqueana

Senegalia santosii

Senegalia scandens

Senegalia serra

Senegalia skleroxyla

Senegalia striata

Senegalia velutina

Senegalia visco

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4927>

<https://www.rostliny.net/>