

Hydrolea spinosa (Lepice trnitá)

čeleď: Hydroleaceae

oblasti: Indonésie, Jamajka, Kuba, Srí Lanka, Texas, Uruguay

Roste v USA, tropické Americe, na jich až po Uruguay jako jednoletka, trvalka či keř a zavlečená byla i jinde. Dorůstá výšky 2m. Stonek je přímý nebo vystoupavý, může být ochlupený, zpravidla žláznatý, v kolénkách vytváří 1 - 2 trny délky 0,5 - 3cm. Listy jsou střídavé, kopinaté až vejčité (i čárkovité), špičaté nebo zašpičatělé, ochlupené, mírně žláznaté, mohou být drobně pilovité, dlouhé 1 - 12cm, široké 0,2 - 3cm a báze je klínovitá. Květenstvím je vijan, vlastní květy jsou 5tičetné, kališní cípy kopinaté, ochlupené, dlouze žláznaté, dlouhé 0,6 - 1,4cm, korunní lístky jsou modré (i bílé) a dlouhé 0,5 - 1,7cm. Plodem je kulovitá až vejčitá tobolka délky 3,5 - 8mm.

Vyhovují ji mokřady, bažiny, okraje řek atp.

Množí se semeny, která plovou na hladině i několik dní.

<https://www.rostliny.net/>