

Bartonia

čeleď: Gentianaceae

Roste v Severní Americe jako jednoletka nebo dvouletka.

Bartonia multiflora

Bartonia paniculata

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nový Brunšvik, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe jako jednoletka nebo dvouletka. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Stonek je vzpřímený až poléhavý, občas popínavý. Listy jsou střídavé a spodní vstřícné. Květenství je latnaté, dlouhé 5 - 10 (i 25)cm, vlastní květy mají průměr 2,5 - 4mm, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 2 - 2,5mm, korunní lístky jsou kopinaté, zašpičatělé a žluté. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. iodandra
- subsp. texana

Bartonia parviflora

Bartonia pumila

Bartonia superba

Bartonia verna

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Texas, Virginie

Roste v Severní Americe jako jednoletka. Kvete bílými 4četnými květy, korunní lístky jsou obvejčité a zašpičatělé

Bartonia virginica

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin,

Západní Virginie

Roste v Severní Americe jako jednoletka. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Listy bývají vstřícné. Květenství je hroznovité nebo latnaté, vlastní květy mají průměr 3 - 4mm, kališní lístky jsou kopinaté, korunní lístky podlouhlé, zpravidla zubaté, zakulacené a zpravidla s hrotem.

<https://www.rostliny.net/>