

Isodon coetsa

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Bangladéš, Bhútán, Filipíny, Himálaj, Indie, Indonésie, Kašmír, Laos, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Bangladéši, Laosu, Myanmaru, Nepálu, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, Tibetu, Indii, Pákistánu, Indonésii a Filipínách v podobě bohatě větveného polokeře nebo byliny. Dorůstá výšky (0,4 -) 0,5 - 1,2 (i 2)m. Povrch je v mládí ochlupený. Listy jsou vstřícné, vejčité, zašpičatělé, vroubkované, na žilkách ochlupené, žláznaté, dlouhé (3 -) 4 - 9 (i 10)cm, široké (1,5 -) 2,5 - 6 (i 6,2)cm, báze je uťatá až klínovitá, žilnatinu tvoří 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 5,5cm. Květenstvím je úzká vrcholová nebo úžlabní lata délky 4 - 15cm, šířky 1,5 - 2,5cm, vrcholíky jsou stopkaté, 2 - 7mikvěté, spodní květní listy přisedlé, vejčité, horní listenovité, vejčité kopinaté, vlastní květy mají 1 - 3mm stopku, kalich zvonkovitý, vně žláznatý, ochlupený, mírně 2pyský, dlouhý i široký 1,5 - 3mm, zuby vejčité 3úhlé, špičaté, koruna růžovofialová až namodralá, ochlupená, dlouhá 6 - 9mm, trubka dlouhá 2,5 - 4mm, horní pysk dlouhý 2,5 - 3,5mm a spodní vejčitý, dlouhý 3,5 - 6mm. Plodem je hnědá obvejčitá tvrdka délky 1,2mm a šířky 0,8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *cavaleriei*/l. *cavaleirei*/*Plectranthus cavaleriei*/*Plectranthus coetsa* var. *cavaleriei*/*Plectranthus macreei*/*Plectranthus mairei*/*Rabdosia coetsa* var. *cavaleriei* - Yunnan, Indie, Srí Lanka; kmínky ochlupené; listy oboustranně ochlupené

- var. *coetsa*/*Ocimum coetsa*/*Plectranthus coetsa*/*Plectranthus leptobotrys*/*Plectranthus maddeni*/*Plectranthus menthoides*/*P. polystachys*/*Rabdosia anisophylla*/*Rabdosia coetsa*/*Rabdosia coetsoides*/*Rabdosia megathyrsoides*/*Rabdosia pluriflora*/*Rabdosia polystachys*/*Rabdosia polystachys* var. *phylloides* - Čína, Bangladéš, Indie, Laos, Myanmar, Nepál, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam; kmínky mohou být ochlupené; listy na žilkách hustě ochlupené

<https://www.rostliny.net/>