

Ixora longifolia

synonyma: *Ixora amboinica*, *Ixora fulgens*, *Pavetta amboinica*, *Pavetta fulgens*

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Indie, Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov, Melanésie, Myanmar (Barma), Pákistán, Vietnam, Yunnan

Roste na Moluckých ostrovech, Jávě, Borneu, Číně, Indii, Indonésii, Filipínách, Vietnamu, Malajském poloostrově a v Myanmaru v podobě vzpřímeného keře, pěstuje se ale i jinde v tropech. Dorůstá výšky do 1 (i 1,5)m. Palisty jsou široké. Listy jsou kopinaté až úzce eliptické, špičaté (i zašpičatělé) až zašpičatělé, dlouhé 10 - 20 (i 30)cm, široké 4 - 7,5cm, báze je klínovitá až tupá, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je vrcholový chocholík s krátkými větvemi šířky 12 - 17cm na 2,5cm stopce, listeny jsou úzce 3úhlé, dlouhé 1 - 1,5mm, vlastní květy jsou červenooranžové, mají (0,5 -) 2 - 3 (i 4)mm stopku, listeny krátké, kališní trubka je krátká, laloky zašpičatělé až tupé, dlouhé (0,5 -) 1 (i 1,5)mm, koruna má trubku délky 2,5 - 3 (i 4,5)cm, laloky jsou vejčité, kopinaté nebo eliptické, špičaté, dlouhé (1 -) 1,5 (i 1,7)cm a široké 3 - 5mm. Plodem je kulovitá peckovice o průměru 0,9 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>