

Jacquemontia (Žakmontka)

čeleď: Convolvulaceae

Roste zejména v tropech a subtropích Ameriky v podobě popínavé nebo poléhavé byliny, méně častěji polokeře nebo keře. Listy jsou celokrajné (i zubaté nebo laločnaté), zpravidla malé a srdčité. Květenstvím je okolík, hlávka nebo hrozen či pouze samostatný květ, ten je bílý až modrofialový, kolovitě zvonkovitý, listeny jsou malé, čárkovité až kopinaté, anebo až podobné listům, vnější kališní lístky mohou být větší než vnitřní, koruna je symetrická, okraj 5tilaločný a mají 5 tyčinek. Plodem je malá kulovitá tobolka obsahující max. 4 semena.

Vyhovuje jí plné slunce a dobře propustná půda.

Množí se semeny nebo 1/2dřevitými řízkami.

Jacquemontia abutiloides

synonyma: *J. abutiloides* var. *abutiloides*

oblasti: Kalifornský záliv, Kalifornský záliv sever, Sonora

Roste v Kalifornském zálivu v podobě popínavého polokeře. Listy jsou řapíkaté. Kvete bleděmodrými až bílými široce zvonkovými květy.

Jacquemontia acrocephala

synonyma: *J. acropetala*, *Thyella acrocephala*

Jacquemontia acuminata

Jacquemontia aequisejala

Jacquemontia albida

Jacquemontia anomala

Jacquemontia asarifolia

Jacquemontia austiniana

Jacquemontia bahiensis

Jacquemontia blanchetii

synonyma: *Convolvulus blanchetii*, *Convolvulus blanchetii* f. *albiflorus*, *Convolvulus blanchetii* f.

coeruleus, Ipomoea filipedunculata, J. blanchetii var. major, J. blanchetii var. puberula, J. martii var. floribunda, Montejacquia blanchetii

oblasti: Bolívie, Brazílie, Peru

Roste v Peru, Bolívii a Brazílii v podobě polokeře. Dorůstá délky 1,5 - 3m. Listy jsou srdčité, vejčité, zašpičatělé s hrotem, dlouhé 4 - 8cm, široké 2 - 5cm, báze je srdčitá, spodní strana řídce ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm. Květenstvím je okolíčnatý (3 -) 7 - 12tkvětý vrcholík na 5 - 10cm stopce, vlastní květy mají 2 - 8mm stopku, kališní lístky vejčité, tupé, mohou brobně ochlupené, dlouhé 4 - 5mm, vnější o 1/3 kratší, koruna je nálevkovitá, modrá až fialová, uprostřed s bílým pruhem, dlouhá 2 - 2,5cm a má 5 zubů.

Jacquemontia bracteosa

synonyma: Thyella bracteosa

Jacquemontia browniana

synonyma: Convolvulus erectus, Convolvulus flexuosus, Ipomoea erecta, J. browniana var. grandiflora

Jacquemontia capitellata

Jacquemontia cataractae

Jacquemontia caudata

Jacquemontia cayensis

oblasti: Kuba, Portoriko

Roste v Karibiku v podobě plazivého nebo vystoupavého větveného keře. Dorůstá délky 0,5 - 2,5m. Povrch může být ochlupený. Listy jsou podlouhlé až široce vejčité, tupé nebo špičaté, dužnaté, dlouhé 1 - 3cm, báze klínovitá nebo zakulacená a řapíky jsou krátké. Květenstvím je chudokvětý vrcholík na krátké stopce, vlastní květy mají kališní lístky vejčité, dlouhé 2mm, koruna je bílá nebo nažloutlá, 5ticípá a o průměru 0,8 - 1,2cm. Plodem je vejčitě kulovitá tobolka délky 5mm.

Jacquemontia cearensis

Jacquemontia cephalantha

Jacquemontia cephalantha

Jacquemontia chodatii

Jacquemontia chrysanthera

Jacquemontia confusa

synonyma: *J. mollissima*

Jacquemontia corymbulosa

synonyma: *J. azurea* var. *parviflora*, *J. guayaquilensis*, *J. prominens*

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Peru a Ekvádoru v podobě ovíjivého polokeře. Povrch je plstnatý. Listy jsou prakticky kulaté až široce vejčité, špičaté s hrotem a zapuštěnou žilnatinou, délky 3,5 - 5cm, šířky 3 - 4cm, báze je srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 0,6 (i 1,2)cm. Květenstvím je hustý bohatý okolíčnatý vrcholík na 5 - 12cm stopce, listeny jsou štětinovité, dlouhé 2mm, vlastní květy mají kališní lístky vejčité, zašpičatělé, vnější délky 6 - 7mm, vnitřní 4 - 5mm, koruna je modrá, široce nálevkovitě zvonkovitá a dlouhá 1,5cm.

Jacquemontia crassifolia

synonyma: *Convolvulus crassifolius*

Jacquemontia cumanensis

synonyma: *Convolvulus cumanensis*, *Convolvulus ferrugineus*, *Ipomoea cumanensis*, *Ipomoea ferruginea*

oblasti: Portoriko

Roste v Karibiku v podobě popínavé trvalky.

Jacquemontia curtisii

oblasti: Florida

Roste v na Floridě v podobě popínavé trvalky.

Jacquemontia cuyabana

Jacquemontia decipiens

Jacquemontia densiflora

synonyma: *J. violacea* var. *densiflora*

Jacquemontia densifolia

synonyma: *Ipomoea graminiformis* var. *densifolia*, *J. densifolia* var. *involuta*

Jacquemontia diamantinensis

Jacquemontia diversifolia

Jacquemontia eastwoodiana

synonyma: *J. abutiloides* var. *eastwoodiana*

Jacquemontia ekmanii

Jacquemontia elegans

Jacquemontia estrellensis

Jacquemontia euricola

Jacquemontia evolvuloides

synonyma: *Convolvulus agrestis*, *Convolvulus breviacuminatus*, *Convolvulus moricandii*, *Convolvulus moricandii* var. *austroparaguensis*, *Convolvulus secundiflorus*, *Evolvulus erectus*, *Ipomoea evolvuloides*, *Ipomoea evolvuloides* var. *grandiflora*, *J. agrestis*, *J. breviacuminata*, *J. decumbens*, *J. diantha*, *J. erecta*, *J. evolvuloides* f. *albiflora*, *J. evolvuloides* f. *hirsutula*, *J. evolvuloides* f. *microphylla*, *J. evolvuloides* f. *tomentosula*, *J. evolvuloides* var. *grandiflora*, *J. evolvuloides* var. *longepedunculata*, *J. evolvuloides* var. *parviflora*, *J. guatemalensis*, *J. hirsuta* var. *parvifolia*, *J. palmeri*, *J. palmeri* var. *varians*, *J. pauciflora*, *J. pedunculata*, *J. racemosa*, *J. secundiflora*, *Montejacquia evolvuloides*

oblasti: Arizona

Roste v podobě popínavé jednoletky.

Jacquemontia ferruginea

Jacquemontia floribunda

synonyma: *Convolvulus floribundus*, *Evolvulus macrophyllus*, *Ipomoea floribunda*

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě šplhavého bohatě větveného keře. Dorůstá výšky až 1m. Listy jsou úzce vejčité, zašpičatělé s hrotem, dlouhé 5 - 8cm, široké 3cm, řapíky žlábkované a dlouhé 3,5cm. Květenstvím je stopkatý chocholík, vlastní květy mají 5mm stopku, kališní laloky podlouhlé, prakticky tupé, vnější větší, délky 4mm, koruna je modrá, krátce nálevkovitá s širokým (i mírně 5tilaločným) lemem a délkou 1,2 - 1,5cm.

Jacquemontia frankeana

synonyma: Convolvulus frankeanus, J. uleana

Jacquemontia fruticulosa

synonyma: J. fruticulosa f. angustifolia, J. fruticulosa f. grandifolia, J. fruticulosa f. subsericea, J. fruticulosa f. viscosissima, J. fruticulosa var. glandulifera

Jacquemontia fusca

synonyma: Ipomoea fusca

Jacquemontia gabriellii

synonyma: Ipomoea gabriellii, J. ciliata, J. nelsonii

Jacquemontia glabrescens

synonyma: J. grandiflora var. glabrescens

Jacquemontia glaucescens

synonyma: Convolvulus pruinus, J. glaucescens var. glabrescens, J. glaucescens var. petiolaris

Jacquemontia glomerata

Jacquemontia gracilis

Jacquemontia gracillima

synonyma: Aniseia gracillima

Jacquemontia grisea

Jacquemontia guaranitica

Jacquemontia guyanensis

synonyma: Convolvulus guianensis, Ipomoea guyanensis, J. ferruginea var. mucronata, Lobake guyanensis

Jacquemontia hallieriana

Jacquemontia hastigera

Jacquemontia havanensis

synonyma: Convolvulus frondosus, Convolvulus garberi, Convolvulus havanensis, Convolvulus jamaicensis, Convolvulus jamaicensis var. major, Convolvulus obtusifolius, Convolvulus ruderarius, Ipomoea frondosa, Ipomoea havanensis, Ipomoea ruderaria, J. jamaicensis, J. ruderaria

oblasti: Belize, Florida, Guatemala, Kuba, Portoriko, Yucatán

Roste ve střední Americe, Karibiku a na Floridě v podobě plazivého až prakticky vzpřímeného polokeře. Dorůstá délky do 1m. Kmínky jsou jemně ochlupené. Listy jsou vejčité až podlouhlé, zakulacené až téměř vykrojené, ztlustlé, krátce řapíkaté, dlouhé 1 - 4cm a báze je zakulacená až tupá. Kvete v chudém stopkatém vrcholíku, občas samostatnými květy, stopky jsou delší kalicha, vnější kališní lístky jsou obvejčité až téměř kulaté, zakulacené, dlouhé 1,5mm, vnitřní mírně delší, koruna je bílá a dlouhá 1cm. Plodem je tobolka délky 3mm obsahující vejčitá semena.

Jacquemontia heterantha

synonyma: Aniseia heterantha, Aniseia heterantha var. pubescens, Calystegia heterantha, Convolvulus martii, Dufourea heterantha, Prevostea heterantha, Reinwardtia heterantha

Jacquemontia heterotricha

synonyma: J. evolvuloides var. tweediei

Jacquemontia hispida

Jacquemontia hitchcockiana

Jacquemontia holosericea

synonyma: Convolvulus divisus, Ipomoea bifida, Ipomoea crotonifolia, Ipomoea holosericea, J. menispermoides, J. menispermoides var. canescens, Montejacquia divisa

Jacquemontia itatiayensis

synonyma: Convolvulus itatiayensis

Jacquemontia lasiocladus

synonyma: Ipomoea lasioclada, Ipomoea lasiocladus, J. choisyana, J. rufovelutina, Thyella choisyana, Thyella rufa-velutina

Jacquemontia linarioides

Jacquemontia linoides

synonyma: Evolvulus graminifolius, Ipomoea linoides, Ipomoea linoides var. major

Jacquemontia lorentzii

synonyma: Convolvulus lorentzii

Jacquemontia macrocalyx

Jacquemontia martii

synonyma: J. alba, J. martii var. acuminata

Jacquemontia mattogrossensis

Jacquemontia maximiliani

Jacquemontia mexicana

synonyma: Aniseia mexicana

oblasti: Guatemala, Mexiko

Roste v Guatemale a Mexiku jako trvalka nebo polokeř. Kmínky jsou v mládí plstnaté. Listy jsou dlouze řapíkaté, široce vejčité, zašpičatělé, mohou být oboustranně ochlupené, dlouhé 3 - 11cm a báze je srdčitá. Květenství je stopkaté, chudé a řídké, listeny kopinaté, dlouhé 0,7 - 1cm, vnější kališní lístky široce vejčité, špičaté nebo zašpičatělé, drobně ochlupené, dlouhé 1 - 1,5cm, na bázi mírně srdčité, koruna je bílá a dlouhá 2 - 3cm.

Jacquemontia mucronifera

synonyma: Convolvulus mucronifer

Jacquemontia multiflora

Jacquemontia multivalvis

Jacquemontia nipensis

Jacquemontia nodiflora

synonyma: Convolvulus albiflorus, Convolvulus mucronatus, Convolvulus nodiflorus, J. monteroi, J. nodiflora var. congesta, J. parviflora var. tomentosa, J. simulata

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Roste ve střední a Jižní Americe v podobě polokeře. Povrch je v mládí ochlupený. Listy jsou vejčité, špičaté až zašpičatělé s krátkým hrotem, oboustranně ochlupené, dlouhé 2,5 - 5,5cm, široké 1,2 - 1,6cm, báze je zakulacená až téměř srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenství bývá bohaté, má 0,2 - 1,2cm stopku, vlastní květy mají kališní lístky prakticky kulaté, velikosti 2 - 3mm, koruna je nálevkovitá, bílá a dlouhá 1 - 1,2cm. Plodem je kulovitá nebo vejčitá tobolka velikosti do 3mm a obsahuje ochlupená semena.

Jacquemontia nummularia

Jacquemontia oaxacana

synonyma: *J. parviflora* var. *oaxacana*

Jacquemontia obcordata

synonyma: *Convolvulus obcordatus*, *J. ovalifolia* subsp. *obcordata*, *J. subsalina*

Jacquemontia obtusata

Jacquemontia ochracea

Jacquemontia ovalifolia

synonyma: *Convolvulus coeruleus*, *Convolvulus ovalifolius*, *Convolvulus quinquepartitus*, *Ipomoea oleracea*, *Ipomoea ovalifolia*, *Ipomoea quinquepartita*, *J. coerulea*, *J. ovata*

oblasti: Havajské ostrovy, Portoriko

Roste v Karibiku a na Havajských ostrovech v podobě popínavé trvalky.

Jacquemontia paniculata

synonyma: *Ipomoea paniculata*

Jacquemontia pannosa

synonyma: *Convolvulus pannosus*, *Ipomoea pannosa*

Jacquemontia paraguayensis

synonyma: *J. fusca* f. *glabrior*, *J. fusca* var. *altosiana*

Jacquemontia parviflora

synonyma: *Convolvulus tenuiflorus*

Jacquemontia parvifolia

synonyma: *J. elegans* var. *parvifolia*

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě polokeře. Stonky jsou široké 1 - 2mm a ochlupené. Listy jsou vejčité, zašpičatělé, zpravidla s hrotem, žilnatina zapuštěná, plstnaté, dlouhé 15 - 20cm, široké 8 - 15cm, báze prakticky srdčitá až zakulacená a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je 4 a vícekvěté, má 4 - 6cm stopku, vlastní květy mají 5 - 7mm stopku, vnější kališní lístky vejčité, tupé, dlouhé 5mm, vnitřní dlouhé 6 - 7mm, koruna je modrá, dlouhá 2,5cm s širokým rozloženým okrajem.

Jacquemontia pentantha

oblasti: Indie, Pákistán

Roste v Indii a v tropické Americe v podobě ovíjivé bohatě větvené ochlupené popínavky. Dorůstá výšky 2 - 3m. Povrch může být ochlupený. Listy jsou vejčité, špičaté až zašpičatělé, mohou být hrubě zubaté, dlouhé 3 - 6cm a báze je srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2,5cm. Květenství je 5 - 12tkvěté s úzce kopinatými listeny délky 2 - 4mm, tvoří je květy na 2 - 4mm stopce s vejčitými až kopinatými špičatými nebo zašpičatělými ochlupenými kališními lístky délky 4 - 5mm, šířky 2 - 4mm, koruna je modrá (i bílá) a dlouhá 2cm. Plodem je kulovitá hnědá tobolka obsahující hnědá semena délky 2,5mm.

Jacquemontia pentanthos

synonyma: *Aniseia velloziana* var. *laxiflora*, *Convolvulus azureus*, *Convolvulus canescens*, *Convolvulus pentanthos*, *Convolvulus pentanthus*, *Convolvulus violaceus*, *Convolvulus zimmermannii*, *Ipomoea canescens*, *J. azurea*, *J. azurea* var. *alba*, *J. canescens*, *J. coelestis*, *J. elongata*, *J. houseana*, *J. violacea*, *J. violacea* var. *abbreviata*, *J. violacea* var. *canescens*, *J. violacea* var. *glabriuscula*, *J. violacea* var. *guatemalensis*, *J. violacea* var. *rotundifolia*

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Portoriko

Roste v Karibiku a na Floridě v podobě popínavé trvalky.

Jacquemontia peruviana

oblasti: Peru

Jacquemontia pinetorum

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale v podobě rozkladitého až vystoupavého větveného polokeře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou 3úhle vejčité, špičaté až zašpičatělé, naředlé, oboustranně ochlupené, dlouhé 2 - 2,5cm, báze je téměř srdčitá a řapíky jsou dlouhé. Květenstvím je dlouze stopkatý hustý vrcholík šířky 1,2cm, listeny jsou malé, šídlovité, vlastní květy jsou krátce stopkaté, kališní lístky ochlupené, vejčitě kulovité, zakulacené, koruna růžovofialová a dlouhá 8mm.

Jacquemontia polyantha

synonyma: *Convolvulus polyanthus*, *J. apiculata*

Jacquemontia pringlei

synonyma: *J. pringlei* var. *glabrescens*

oblasti: Arizona

Roste v USA v podobě popínavého keře.

Jacquemontia prostrata

Jacquemontia pycnocephala

synonyma: Thyella pycnocephala

Jacquemontia reclinata

oblasti: Florida

Roste na Floridě v podobě popínavého polokeře. Dorůstá délky až 1m. Listy jsou tuhé, tmavězelené, lesklé a dlouhé do 3cm. Kvete bílými 5ticípyými květy.

Vyhovují jí písčité duny na plném slunci.

Jacquemontia revoluta

Jacquemontia robertsoniana

Jacquemontia rojasiana

Jacquemontia rojasii

Jacquemontia rondonii

Jacquemontia rufa

Jacquemontia rusbyana

Jacquemontia sandwicensis

synonyma: Convolvulus ovatifolius, Convolvulus sandwicensis, J. ovalifolia subsp. sandwicensis, J. sandwicensis var. laevis

Jacquemontia saxicola

Jacquemontia seemannii

Jacquemontia selloi

synonyma: Aniseia minor, Convolvulus meisneri, Convolvulus meisneri f. albiflorus, Convolvulus

meisneri f. coeruleus, Ipomoea selloi, Ipomoea selloi var. rufescens, J. loefgrenii, J. selloi f. albicans, J. selloi f. parviflora, J. selloi f. procumbens, J. selloi var. brevipedunculata, J. selloi var. guaranitica, J. selloi var. tomentosa

Jacquemontia serpyllifolia

synonyma: Convolvulus serpyllifolius, Convolvulus valenzuelanus, Ipomoea serpyllifolia

Jacquemontia sinuata

Jacquemontia smithii

Jacquemontia solanifolia

synonyma: Convolvulus filiformis, Convolvulus solanifolius, Exogonium filiformis, Exogonium solanifolium, Ipomoea filiformis, Ipomoea solanifolia, Quamoelit filiformis, Quamoelit solanifolia

oblasti: Portoriko

Roste v Karibiku v podobě popínavé trvalky.

Jacquemontia sphaerostigma

synonyma: Convolvulus apocynoides, Convolvulus aureus, Convolvulus nevisiensis, Convolvulus sphaerostigma, Convolvulus sphaerostigma var. depauperatus, Ipomoea nevisiensis, Ipomoea sphaerostigma, J. agricola, J. apocynoides, J. evolvuloides var. brevipedunculata, J. hirsuta, J. hirsuta f. racemosa, J. hirsuta var. adenotricha, J. hirsuta var. pohlii, J. hirsuta var. trichodonta, J. laxiflora, J. viscidulosa

Jacquemontia spherocephala

synonyma: Thyella spherocephala

Jacquemontia spicaeflora

synonyma: Ipomoea spicaeflora

Jacquemontia staplesii

Jacquemontia subsessilis

synonyma: Convolvulus subsessilis

Jacquemontia tamnifolia

synonyma: Convolvulus capitatus, Convolvulus ciliatus, Convolvulus condensatus, Convolvulus crinitus, Convolvulus guineensis, Convolvulus praelongus, Convolvulus pycnanthus, Convolvulus tamnifolius, Convolvulus villosus, Ipomoea convolvulus var. guineensis, Ipomoea guineensis, Ipomoea macropoda, Ipomoea tamnifolia, Ipomoea trichocephala, J. capitata, J. macrocephala, Thyella macrocephala, Thyella tamnifolia

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Roste v USA a Karibiku v podobě popínavé jednoletky.

Jacquemontia tomentella

synonyma: Lettsomia tomentella

oblasti: Borneo, Sumatra

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. heteroradiata - jihovýchodní Borneo; jako var. micrantha, ale hvězdovité chlupy ve 2 typech, některé mají 8 - 10 ramen s jedním delším a vzpřímeným
- var. micrantha - Sumatra a Borneo; chvězdovité chlupy jako var. tomentella, ale stříbřitější; kališní lístky dlouhé 3 - 4mm, koruna červeně růžovofialová, růžová nebo bílá a dlouhá 0,8 - 1cm; tobolky vejčité s hrotem, hnědé, vysoké 8mm a obsahují až 4 hnědočerná semena
- var. tomentella - Sumatra; popínavý keř; délka až 12m; kmínky na vrcholu hranaté, v mládí hvězdovitě ochlupené; listy vejčité, zašpičatělé, hvězdovitě ochlupené, dlouhé 6 - 14cm, široké 4 - 10cm, báze zakulacená až mírně srdčitá, spodní strana světlejší, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4,5cm; květenství je hustě okolíčnaté, jednostranně latnaté, vrcholové, má stopky cca délky listů, spodní listeny jsou větší, horní menší, vlastní květy mají 3 - 6mm stopku, kališní lístky délky 5 - 6mm, 2 vnější vejčité, tupé, 3 vnitřní vejčité až kulaté, koruna nálevkovitá, růžová nebo bílá a dlouhá 1,4 - 1,5cm
- var. tomentosa - Borneo; jako var. micrantha, ale hvězdovité chlupy mají 3 - 4 (i 5) ramen delších než u var. micrantha, zpravidla různé délky; spodní strana listů hustěji ochlupená než na horní straně, která může být až holá

Jacquemontia tuerckheimii

Jacquemontia turneroides

synonyma: Ipomoea turneroides

Jacquemontia umbellata

Jacquemontia unilateralis

synonyma: Convolvulus salviifolius, Convolvulus secundus, Convolvulus unilateralis, J. secunda

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě polokeře. Kmínky jsou bohaté, poléhavé, bohatě větvené, široké 1 - 5mm a přírůstky dlouhé 2 - 15cm. Povrch je plstnatý až ochlupený. Listy jsou vejčité až úzce eliptické, špičaté až tupé, s drobným hrotem, dlouhé 2 - 9cm, široké 1 - 6cm, báze je zakulaceně uťatá až

mírně srdčitá. Květenstvím je 2 až mnohokvětý chocholičnatý vrcholík na 1,5 - 17cm stopce, listeny jsou čárkovité, dlouhé 4 - 8mm, sekundární stopky jsou dlouhé 0,2 - 2,5cm, listence čárkovité, dlouhé 3 - 5mm, vlastní květy mají 2 - 6mm stopku, kališní lístky vejčité, prakticky tupé, špičaté nebo zašpičatělé, vnější dlouhé 0,5 - 1cm, široké 4 - 7mm, vnitřní mohou být plstnaté, dlouhé 5 - 7mm, široké 3,5 - 4,5mm, koruna je zvonkovitá, modrá a dlouhá 1,7 - 2,8cm. Plodem je prakticky kulatá tobolka o průměru 4 - 5mm a obsahuje semena délky 2,5 - 3mm.

Jacquemontia velloziana

synonyma: *Aniseia velloziana*, *Aniseia velloziana* var. *densiflora*, *Ipomoea velloziana*, *J. bifida*, *J. ferruginea* var. *elongata*, *J. grandiflora*, *Montejacquia bifida*

Jacquemontia velutina

synonyma: *J. bifurcata*

Jacquemontia verticillata

synonyma: *Convolvulus micranthus*, *Convolvulus nodiflorus* var. *deglabratus*, *Convolvulus parviflorus*, *Convolvulus plumerii*, *Convolvulus polycarpus*, *Convolvulus quinquenervis*, *Convolvulus sherardii*, *Convolvulus solanifolius*, *Convolvulus verticillatus*, *Emulina parviflora*, *Evolvulus sherardii*, *Ipomoea polycarpa*, *Ipomoea verticillata*, *J. micrantha*, *J. verticillata* var. *stenophylla*, *Stylisma sherardii*

oblasti: Portoriko

Roste v Karibiku v podobě popínavé trvalky.

Jacquemontia villosissima

Jacquemontia warmingii

Jacquemontia weberbaueri

Jacquemontia zollingeri

synonyma: *Convolvulus zollingeri*

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2279>

<https://www.rostliny.net/>