

Lophira (Lofira)

čeleď: Ochnaceae

Rodové jméno pochází z řeckého slova lofos = hřeben nebo chochol, které odkazuje na plody. Roste v tropické Africe v podobě stromu s přímým kmenem. Plody jsou křídlaté. Nejznámějším druhem je *L. alata*. Využívá se v léčitelství.

Lophira alata (Lofira křídlatá)

synonyma: *L. africana*, *L. alata* var. *procera*, *L. barberi*, *L. barteri*, *L. macrophylla*, *L. procera*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Ghana, Kamerun, Libérie, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Republika Kongo, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Súdán, Uganda

Roste v Kamerunu, Republice Kongo, Demokratické Republice Kongo, Pobřeží Slonoviny, Rovníkové Guineji, Gabonu, Ghaně, Libérii, Nigérii, Sieře Leoně, Súdánu a Ugandě v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky až 30 - 55 (i 60)m při průměru kmene 1,5 - 1,8m. Borka je hnědočervená a v mládí šedozelená. Dřevo je světle růžové, jádrové je pak tmavě hnědočervené až hnědé. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou eliptické, zakulacené, tmavězelené, kožovité a dlouhé až 25cm. Květenstvím je zapáchající kuželovitá lata délky 12 - 20cm, vlastní květy jsou bílé, mají 1 - 2cm stopku, korunní lístky jsou obsrdčité, dlouhé 1,7cm a široké 1,4cm. Plodem je oříšek se 2ma nestejnými křídly.

Lophira lanceolata

synonyma: *L. spathulata*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Senegal, Súdán, Uganda

Roste od Senegalu po Súdán, Ugandu a Demokratickou Republiku Kongo v podobě stromu s úzkou korunou. Dorůstá výšky do 16m. Kmen nebývá do 8m větvený a v průměru má 70cm. Borka je šedá a korkovitá. Větve jsou vystoupavé. Listy vyrůstají v přeslenech, jsou střídavé, podlouhlé, zakulacené a v mládí růžové nebo červené. Květenstvím je vrcholová lata, vlastní květy jsou oboupohlavné, 5tičetné a bílé. Plodem je kuželovitá nažka s okřídleným kalichem obsahující 1 velké semeno.

<https://www.rostliny.net/>