

Diplycosia brachyantha

synonyma: D. var. parvula

čeleď: Ericaceae

oblasti: Sumatra

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. brachyantha - Sumatra; keř; větve v mládí tupě hranaté, šedohnědé, na koncích mohou být štětinaté, tlusté 4 - 7mm; listy eliptické, zašpičatělé, tupé nebo zakulacené, podvinuté, kožovité, lesklé, tmavě tečkované, dlouhé 4,5 - 10cm, široké 2,5 - 6,5cm, báze klínovitá až prakticky zakulacená, žilnatinu tvoří 1 - 2 žilky, řapíky dlouhé 6 - 9mm, v horní 1/3 mírně křídlaté; kvete v (1 -) 3 - 5tkvětých svazečcích na stopce délky 5 - 7mm, bazální listeny chudé, vejčité, zašpičatělé, dlouhé 1 - 2mm, listence široce vejčité s hrotem, vně ochlupené, dlouhé 2mm, kalich dlouhý 6mm, hluboce 5tilaločný, laloky vejčité, zašpičatělé, dlouhé 4mm, koruna zvonkovitá, zelená, vně může být ochlupená, dlouhá 6 - 7mm, laloky vzpřímené a dlouhé 3mm; plodem je prakticky černá tobolka průměru 1,3cm
- var. parvula - listy obvejčité, dlouhé 2 - 3,5cm, široké 1 - 2cm; květy bílé, koruna dlouhá 5 - 6mm a široká 3mm

<https://www.rostliny.net/>