

Diplycosia caryophylloides

čeleď: Ericaceae

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *caryophylloides* - epifytický keř; výška 1m; větve téměř hranaté, bělavé až šedé, v mládí na vrcholcích žláznatě štětinaté; listy eliptické, široce zašpičaté až tupé, podvinuté, kožovité, dlouhé 4,5 - 7cm, široké 2,5 - 3,6cm, báze široce klínovitá až zakulacená, spodní strana zprvu štětinatá, řídce tečkovaná, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 5mm; květy ve 3 - 6tičetném svazečku na 3 - 5mm stopce, bazální listeny bohaté, malé, listence vejčitě 3úhlé, dlouhé 1,5mm, kalich obkruželovitý, laloky dlouhé 1,7mm, koruna zvonkovitá, zelenobílá, dlouhá 5 - 6mm, laloky špičaté a dlouhé 2mm; plody hruškovité modré tobolky, dlouhé 8mm a široké 4mm
- var. *longipes* - listy dlouhé 3 - 5cm, široké 1,5 - 2,5cm, řapíky dlouhé 4 - 7mm

<https://www.rostliny.net/>