

Diplycosia heterophylla

synonyma: *Diplycosia bartlettii*, *Gaultheria heterophylla*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundry, Sumatra

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *heterophylla* - Sumatra, Jáva, Malé Sundry a Borneo; keř nebo strom, zpravidla epifytický; výška do 7m; větve našedlé, tupě hranaté, v mládí červené, občas žláznatě ochlupené; listy podlouhlé, eliptické nebo obvejčité, špičaté nebo tupé (i zakulacené), tmavě zelené, lesklé, kožovité, v mládí ochlupené, dlouhé 3 - 10cm, široké 1 - 3,5cm, báze špičatá nebo tupá, spodní strana řídce tečkovaná, žilnatinu tvoří 3 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 7mm; kvete ve 4 - 15tkvětém svazečku na 4 - 7mm stopce, bazální listeny jsou široce 3úhlé, tupé, třásnité, listence prakticky vejčité kulaté, tupé, kýlnaté, dlouhé 1,5mm, kalich má délku 2,5 - 3mm, laloky jsou vejčité, tupé, dlouhé 1,5 - 2mm, koruna úzce zvonkovitá, růžově bílá až nazelenalá, dlouhá 4 - 6mm, široká 2 - 4mm a laloky jsou dlouhé 1,5mm; plodem je růžovofialově modrá až černá tobolka průměru 4 - 5mm
- var. *latifolia* - Sumatra, Malajský poloostrov, Jáva, Borneo a Filipíny; listy eliptické až mírně vejčité, kožovité, dlouhé 8 - 16 (i 20)cm, široké 3 - 10 (i 12)cm

<https://www.rostliny.net/>