

Diplycosia soror

čeleď: Ericaceae

Roste na Nové Guineji. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. nuda - větve v mládí prakticky holé; listy dlouhé do 4,5cm, široké 2,8cm
- var. soror - i epifytický vzpřímený keř i s více kmeny; výška 0,3 - 1,5m; větve v mládí prakticky hranaté, štětinaté, hnědočervené nebo načervenalé; listy eliptické, zašpičatělé, tupé až zakulacené, zpravidla s hrotem, podvinuté, v horní části vroubkované, tmavězelené, v mládí oboustranně štětinaté, dlouhé 1,5 - 2,8cm, široké 0,9 - 2cm, báze klínovitá, spodní strana tmavě tečkovaná, žilnatinu tvoří 3 (i 5) žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm; kvete v úžlabí po 1 (i 2)ks na 2 - 3mm stopce, bazální listeny jsou malé, listence široce vejčité, kalich dlouhý 1,5 - 2mm, ze 2/3 5tilaločný, laloky vejčité, prakticky špičaté, narůžovofialovělé, na okraji ochlupené, koruna krátce baňkovitá, zelená, dlouhá 3,5mm, laloky dlouhé 1mm; plodem je modře růžovofialová až prakticky černá ojíňená tobolka o průměru 4 - 5mm

<https://www.rostliny.net/>