

# Kleinhovia (Kleinhovie)

čeleď: Malvaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest německého lékaře a botanika jménem Christian Kleinhoff († 1777). Existuje pouze 1 druh.

## Kleinhovia hospita

oblasti: Austrálie, Filipíny, Hainan, Indonésie, JV Čína, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Melanésie, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Portoriko, Srí Lanka, Tchaj-wan, Thajsko, Tichý oceán, Z Afrika

Roste na Hainanu, Tchaj-wanu, jihovýchodní Asii, Austrálii a Africe v podobě stálezeleného stromu s hustou zakulacenou korunou. Dorůstá výšky 6 - 12 (i 20)m. Borka je šedá. Větve jsou v mládí šedozelené a řídce ochlupené. Palisty jsou čárkovité, dlouhé až 8mm. Listy jsou střídavé, vejčité, v horní 1/2 řídce zubaté, špičaté až zašpičatělé, dlouhé (5 -) 5,5 - 18 (i 25)cm, široké (4 -) 5,5 - 9 (i 18)cm, báze je srdčitá, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé (2 -) 3 - 5,5 (i 6)cm. Kvete červenými 5tičetnými květy o průměru 4 - 7mm na 0,2 - 0,5 (i 1)cm stopce v chudé latě délky do 50cm, listence jsou kopinaté, dlouhé 2 - 4mm, ochlupené, kališní lístky jsou růžové, úzce kopinaté, ochlupené, dlouhé 6 - 8mm, široké 2mm a korunní lístky jsou nadvinuté, dlouhé 4 - 6mm, široké 2mm, spodní pár je úzce podlouhlý, žlutý a dlouhý 0,8 - 1,5cm. Plodem je hruškovitá až kulovitá žebnatá tobolka délky 2 - 3cm, průměru 1,5 (i 2,5)cm a obsahuje kulovitá bělavá semena o průměru 1,5 - 2mm.

Vyhovují ji okraje vodních toků nebo paseky, dostatek vody, ale i se suchým obdobím.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2319>

<https://botany.cz/cs/kleinhovia-hospita/>

<https://www.rostliny.net/>