

# Kyllinga

synonyma: Cyprolepis, Hedychloa, Killinga, Lyprolepis, Thryocephalon

čeleď: Cyperaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest dánského botanika ze 17. století jménem Peder Lauridsen Kylling. Roste v tropech celého světa, zejména v Africe jako trvalka (i jednoletka). Dorůstá výšky 0,025 - 1m.

## Kyllinga alba

synonyma: Cyperus cartilagineus var. laevisimus, Cyperus cristatus var. nigritanus, Cyperus nigripes var. grandiceps, K. alba subsp. alba, K. alba var. diminuta, K. alba var. laevisima

## Kyllinga alba-purpurea

synonyma: Cyperus alba-purpureus

## Kyllinga brevifolia

synonyma: Cyperus erectus var. auratus, Cyperus erectus var. intricatus, K. aurata, K. brevifolia f. brevifolia, K. brevifolia subsp. brevifolia, K. brevifolia var. brevifolia, K. cruciata, K. erecta var. aurata, K. erecta var. intricata, K. hohenackeri, K. intermegia var. oligostachya, K. monocephala, K. odorata

oblasti: Afganistán, Austrálie, Dálněvýchodní federální okruh, Indie, Japonsko, Jižní Amerika, Kavkaz, Makaronésie, Malajsie, Pákistán, Severní Amerika, Tchaj-wan

Roste v tropické Americe jako trvalka a zavlečená byla do teplých oblastí celého světa. Dorůstá výšky 5 - 35 (i 50)cm. Pod zemí vytváří dlouhý plazivý oddenek průměru 2mm. Stonek je vzpřímený, ostře 3hranný, zelený a průměru 0,5 - 1,5mm. Listy jsou kratší stonku, špičaté, dlouhé do 10cm, široké 1,5 - 3mm, pochva je šedá až hnědá a dlouhá 1 - 6,5cm. Květenství tvoří 100 klásků délky 5 - 7mm.

## Kyllinga bulbosa

synonyma: Cyperus richardii var. angustior, Cyperus richardii var. oliganthus, K. macrocephala var. angustior, K. macrocephala var. oligantha, K. monocephala, K. nana, K. pumila, K. schimperi

## Kyllinga capillaris

## Kyllinga cartilaginea

## Kyllinga chrysantha

synonyma: K. chrysantha var. chrysantha

## Kyllinga chysanthoides

### Kyllinga comosipes

synonyma: *Cyperus cartilagineus* var. *angustatus*, *Cyperus eximius* var. *kelleri*, *K. aurea*, *K. comosipes* var. *angustata*, *K. comosipes* var. *comosipes*, *K. eximia* var. *kelleri*, *K. leucocephala*

### Kyllinga controversa

synonyma: *K. alba*

### Kyllinga crassipes

synonyma: *Cyperus bulbipes* var. *pallescens*

### Kyllinga curvispiculosa

synonyma: *Cyperus curvispiculosus*

### Kyllinga elata

synonyma: *Cyperus aromaticus* var. *elatus*, *K. polyphylla* var. *elata*

### Kyllinga erecta

synonyma: *Cyperus erectus* f. *minor*, *Cyperus erectus* f. *pallescens*, *Cyperus erectus* subsp. *albescens*, *Cyperus erectus* var. *intercedens*, *Cyperus erectus* var. *pleiocarpus*, *Cyperus erectus* var. *schlechteri*, *Cyperus monocephalus*, *K. consanguinea*, *K. erecta* subsp. *albescens*, *K. erecta* var. *erecta*, *K. erecta* var. *intercedens*, *K. erecta* var. *pleiocarpa*, *K. erecta* var. *schlechteri*

### Kyllinga flava

synonyma: *Cyperus oblongus* subsp. *flavus*, *K. nervosa* subsp. *flava*, *K. nervosa* var. *flava*

### Kyllinga gracillima

synonyma: *Cyperus brevifolius* var. *gracillimus*, *K. brevifolia*, *K. brevifolia* var. *gracillima*, *K. brevifolia* var. *leiocarpa*, *K. brevifolia* var. *leiolepis*, *K. brevifolioides*, *K. monocephala* var. *leiocarpa*, *K. monocephala* var. *leiolepis*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Maryland, Mississippi, Missouri, New York, Ohio, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie

Roste v USA jako trvalka.

### Kyllinga inaurata

synonyma: *Cyperus inauratus* var. *laevicarinatus*, *K. tetragona*

### Kyllinga kamschatica

synonyma: *K. brevifolia* subsp. *kamtschatica*, *K. riederiana*

## Kyllinga liebmanniana

## Kyllinga melanosperma

synonyma: *Cyperus melanosperma*, *Cyperus melanospermus* var. *imerinensis*, *Cyperus melanospermus* var. *perrieri*, *Cyperus melanospermus* var. *plurifolius*, *K. brevifolia*, *K. fuscescens*, *K. imerinensis*, *K. imerinensis* var. *perrieri*, *K. melanosperma* subsp. *melanosperma*, *K. melanosperma* var. *plurifoliata*, *K. perrieri*, *K. plurifoliata*, *K. vaginata*

oblasti: Afrika, JV Asie

Roste v tropické Africe a jižní a jihovýchodní Asii. Pod zemí vytváří oddenek délky 0,3 - 1m a průměru 2,5 - 4mm.

## Kyllinga nervosa

synonyma: *K. nervosa* subsp. *nervosa*

## Kyllinga oblonga

synonyma: *Cyperus oblongus*, *K. nervosa* subsp. *oblonga*

## Kyllinga odorata

synonyma: *Cyperus kernianus*, *Cyperus sesquiflorus* f. *bulbiferus*, *Cyperus sesquiflorus* f. *denticulatus*, *Cyperus sesquiflorus* f. *dunensis*, *Cyperus sesquiflorus* f. *elongatus*, *Cyperus sesquiflorus* f. *globosus*, *Cyperus sesquiflorus* f. *gracilis*, *Cyperus sesquiflorus* f. *spinulosus*, *Cyperus sesquiflorus* var. *minor*, *Cyperus sesquiflorus* var. *pluriceps*, *K. brasiliensis*, *K. campestris*, *K. cylindrica* forma *latifolia*, *K. leucocephala*, *K. leucocephala* var. *pluriceps*, *K. martiana*, *K. monocephala*, *K. odorata* subsp. *odorata*, *K. odorata* var. *bulbifera*, *K. odorata* var. *dunensis*, *K. odorata* var. *elongata*, *K. odorata* var. *gracilis*, *K. odorata* var. *latifolia*, *K. odorata* var. *major*, *K. odorata* var. *minor*, *K. odorata* var. *odorata*, *K. odorata* var. *pluriceps*, *K. odorata* var. *rigida*, *K. pellucidoalbida*, *K. pellucidolucida*, *K. pumila*, *K. triceps*, *K. tuberosa*, *Schoenus odoratus*

oblasti: Alabama, Angola, Arkansas, Austrálie, Čína, Florida, Georgia, Indie, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Mosambik, Nepál, Nové Mexiko, Oklahoma, Pákistán, Portoriko, Severní Karolína, Srí Lanka, Texas, Vietnam

Roste v Africe, Pákistánu, Nepálu, Indii, Srí Lance, Číně, Vietnamu, Austrálii, USA a střední Americe jako jednoletka nebo trvalka. Dorůstá výšky 5 - 35cm. Stonek je 3hranný s průměrem 0,5 - 1mm. Listy dorůstají 1/2 délky stonku, jsou šedo zelené, špičaté, dlouhé do 20cm, široké 2,5mm, pochva je šedá, postupně černající a dlouhá do 6cm. Květenství vyrůstá po (1 -) 3 (i 6)ti ks, je přisedlé, kompaktní, kulovité, zelenobílé, velikosti 0,6 - 1cm, tvoří ho 50 - 100 klásků ve spirále, 2 - 4 listeny délky do 10cm, lásky jsou vejčité, dlouhé 2 - 2,5mm a široké 0,8mm.

## Kyllinga pachystyla

## Kyllinga planiculmis

synonyma: *Cyperus kyllingia* var. *latifolius*, *Cyperus sesquiflorus* f. *latifolius*, *K. monocephala* var. *latifolia*

### Kyllinga platyphylla

synonyma: *Cyperus ciliatopilosus* var. *longifolius*, *Cyperus ciliatopilosus* var. *rhizomatosus*, *K. platyphylla* var. *longifolia*

### Kyllinga pluristaminea

### Kyllinga polyphylla

synonyma: *Cyperus aromaticus* var. *brachyrhizomatosus*, *Cyperus aromaticus* var. *repens*, *Cyperus aromaticus* var. *teres*, *K. planiceps*, *K. polyphylla* var. *polyphylla*, *Pycneus erecta* var. *polyphylla*

### Kyllinga primula

### Kyllinga pulchella

synonyma: *Cyperus teneristolon* var. *robustior*, *K. anomala*, *K. pulchella* f. *robustior*

### Kyllinga pumila

synonyma: *Cyperus densicaespitosus* var. *rigidulus*, *Hedychloa fragrans*, *K. blepharinota*, *K. fraterna*, *K. monocephala*, *K. naumanniana* var. *tenuis*, *K. odorata*, *K. pumila* var. *humilis*, *K. viridiflora*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA a Karibiku jako jednoletka nebo trvalka.

### Kyllinga ramosa

### Kyllinga ruwenzoriensis

synonyma: *Cyperus oblongus* var. *ruwenzoriensis*

### Kyllinga senegalensis

synonyma: *Cyperus senegalensis*

### Kyllinga squamulata

oblasti: Angola, Florida, Georgia, Indie, Karibik, Kavkaz, Madagaskar, Mosambik, Pákistán

Roste v tropické Africe a Madagaskaru, Indii a Pákistánu jako jednoletka a zavlečená byla na Kavkaz a Martinik. Dorůstá výšky 5 - 18cm. Kořenový systém je malý. Stonek je ostře 3hranný a průměru 1mm. Listy mají délku stonku, jsou šedozelené, špičaté, dlouhé 13cm, široké 3mm, pochva je červeně žilkovaná a dlouhá do 5cm. Květenství je kulovité, složené z 50 - 100 klásků, má 3 - 4

listeny délky do 15cm, klásky jsou úzce vejčité, mírně zahnuté, dlouhé 5,5 - 6mm, široké 1mm a stopka je dlouhá 0,5mm.

### Kyllinga stenophylla

synonyma: *Cyperus densicaespitosus* var. *stenophyllus*

### Kyllinga tenuifolia

synonyma: *Cyperus triceps* var. *angustifolius*, *Cyperus triceps* var. *obtusiflorus*, *K. tenuifolia* var. *tenuifolia*, *K. triceps* var. *obtusiflora*

### Kyllinga tibialis

synonyma: *Cyperus aphyllus*

oblasti: Portoriko

Roste v Karibiku jako trvalka.

### Kyllinga ugogensis

synonyma: *K. ferruginea*

### Kyllinga vaginata

synonyma: *Cyperus aphyllus*, *Cyprolepis denudata*, *K. obtusata* var. *cylindrostachyus*, *K. peruviana*, *K. tenuis*, *K. vaginata*

oblasti: Portoriko

Roste v Karibiku jako trvalka.

### Kyllinga ×nemoralis

synonyma: *Cyperus kyllingia* f. *humilis*, *Cyperus kyllingia* f. *subtriceps*, *Cyperus kyllingia* f. *tenuis*, *Cyperus leucocephalus*, *K. cephalotes*, *K. gracilis*, *K. intermedia*, *K. mindorensis*, *K. monocephala*, *K. monocephala* var. *humilis*, *K. monocephala* var. *subtriceps*, *K. monocephala* var. *tenuis*, *K. planiculmis* var. *mucronata*, *Scirpus cephalotes*, *Thryocephalon nemorale*

<https://www.rostliny.net/>