

Laggera alata

synonyma: *Blumea alata*, *Blumea alata* var. *alata*, *Blumea alata* var. *natalensis*, *Conyza alata*, *Conyza nutans*, *Erigeron alatus*, *Ethulia conyzoides*, *Inula exsiccata*, *L.* var. *alata*, *L.* var. *angustifolia*, *L.* var. *dentata*, *Laggera angustifolia*, *Vernonia alata*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Bangladéš, Filipíny, Indie, Indonésie, Madagaskar, Myanmar (Barma), Pákistán, Srí Lanka

Roste v Africe, Madagaskaru, Pákistánu až Indonésii v podobě mohutné bohatě větvené byliny. Dorůstá výšky do 60 (i 75)cm. Stonek je křídlatý, občas mírně zubatý. Listy jsou podlouhlé, špičaté až zašpičaté, zubaté, ochlupené, dlouhé 2 - 8 (i 10)cm a široké 0,7 - 1,5cm. Květenstvím je hrozen z úborů o průměru 1 - 1,3cm, zákrov je 4 - 5řadý, vnější zákrovní lístky jsou kopinaté, dlouhé 9mm, široké 1mm, vnitřní zelené, dlouhé do 1cm, koruna samičích květů je dlouhá 6mm, mírně zubatá, u oboupohlavných dlouhá 7 - 8mm a 5tilaločná. Plodem je tmavě hnědá nažka délky 1mm s chmýrem délky 6 - 7mm.

<https://www.rostliny.net/>