

## Alophia drummondii

synonyma: *Alophia drummondiana*, *Alophia lahue* subsp. *drummondii*, *Beatonia bracteolata*, *Calydorea punctata*, *Chlamydstylus bracteolatus*, *Cypella drummondii*, *Eustylis punctata*, *Eustylis purpurea*, *Gelasine punctata*, *Herbertia drummondii*, *Nemastylis bracteolata*, *Nemastylis punctata*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Arkansas, Bolívie, Guyana, Louisiana, Mexiko, Mississippi, Oklahoma, Paraguay, Texas

Roste v USA a Mexiku a dále v Paraguayi, Guyaně a Bolívii. Dorůstá výšky 15 - 45cm. Pod zemí vytváří tmavě hnědou hlízu o průměru (0,5 -) 0,8 - 1,5cm. Stonek je jednoduchý nebo s 2ma větvemi. Vytváří 3 - 6 listů, bazální jsou 2 - 3, úzce kopinaté, délky 15 - 30cm. Květenství je 2 - 4květé na 30cm dlouhých lodyhách, vlastní květy mají průměr 5cm, vnější lístky mají délku 2,4 - 3cm, vnitřní délku (3 -) 3,5 - 4,2cm, korunní lístky jsou široce vejčité, tmavě růžově fialové, dlouhé 2 - 2,5cm, široké 1,7 - 1,9cm, vnitřní kopinaté, žluté s hnědočervenými až černými skvrnami, dlouhé 1,6 - 2cm a široké 1 - 1,2cm. Plodem je tobolka délky 1,5 - 3cm a obsahuje vejčitá semena délky 2,5mm a šířky 2mm.

Vyskytuje se v písčitých půdách v prériích i na okrajích lesů.

<https://www.rostliny.net/>