

Melicytus (Mnohočerák)

synonyma: Hymenantha

čeleď: Violaceae

Roste na Norfolku, ostrově Lorda Howa, Tongu, Fidži, Austrálii a Novém Zélandě v podobě stálezeleného nebo 1/2opadavého dvoudomého keře nebo malého stromu. Listy jsou střídavé a zubaté. Kvete malými 5tičetnými květy ve svazečcích na kolénkách. Plodem je růžově fialová nebo bílá bobule.

Vyhovuje jim plné slunce nebo polostín a vlhká dobře propustná půda. Zimuje za teploty 3 - 5°C.

Množí se semeny nebo řízky.

Melicytus alpinus

synonyma: Hymenantha alpina, Hymenantha dentata var. alpina

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě poléhavého hustě větveného keře. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1)m. Větve jsou mírně trnité. Listy jsou 1/2opadavé, úzce obvejčité až podlouhlé, zpravidla seskupené na kolénkách, tuhé, tlusté a dlouhé (0,4 -) 0,6 - 0,8 (i 1,8)cm. Kvete žlutými (i načervenalými) zvonkovými převislými květy délky do 6mm. Plodem je bílá růžově fialově skvrnitá bobule velikosti 4 - 6mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Pygmaea' - zakrslý habitus

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, nízká zálivka, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Melicytus angustifolius

synonyma: Hymenantha angustifolia, Hymenantha dentata var. angustifolia

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky 3m. Větve mají v mládí světlé lenticely. Listy zpravidla chybí, jsou čárkovité, mohou být laločnaté a dlouhé 0,6 - 1,8cm. Kvete drobnými samostatnými květy.

Melicytus chathamicus

synonyma: Hymenantha chathamica, Hymenantha latifolia var. chathamica

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě.

Melicytus collinus

Melicytus crassifolius

synonyma: *Hymenanchera crassifolia*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě.

Melicytus dentatus

synonyma: *Hymenanchera dentata*, *Solenanthes spinosa*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii a Tasmánii v podobě keře. Dorůstá výšky do 3,5 (i 4)m (v alpinském pásu pouze 60cm). Větve jsou trnité. Listy jsou úzké, občas mělce zubaté a dlouhé 0,5 - 5cm. Kvete světle žlutými aromatickými květy délky 3 - 5mm se zpětně zahnutými korunními lístky. Plodem je světle zelená až růžově fialově černá kulatá bobule o průměru 4 - 5 (i 6)mm.

Melicytus drucei

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě.

Melicytus fasciger

oblasti: Melanésie, Tichý oceán

Roste na Fidži, Šalamounových ostrovech a Vanuatu.

Melicytus flexuosus

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě.

Melicytus lanceolatus

synonyma: *M. microphyllus*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky do 5m. Borka je nahnědlá. Větve jsou křehké. Listy jsou kopinaté, jemně tupě pilovité, dlouhé 5 - 16cm, široké 0,5 - 3cm a řapíky jsou dlouhé do 1,5cm. Květy mají 0,5 - 1cm stopku, průměr 5mm, kališní cípy jsou čárkovité až úzce podlouhlé, tupé a korunní lístky jsou růžově fialově fialové. Plodem je tmavě růžově fialová prakticky kulovitá bobule průměru 4 - 6mm a obsahuje 6 - 12 semen. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *latior* - listy úzce kopinaté, širší, široké 2 - 2,5cm; korunní lístky na vrcholu oranžové a tmavě růžově fialové

Melicytus latifolius

synonyma: *Hymenantha latifolia*, *Suttonia tenuifolia*

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii.

Melicytus macrophyllus

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky do 6m. Borka je nahnědlá. Listy jsou obvejčité až podlouhlé, špičaté, hrubě vykrajovaně pilovité, dlouhé 5 - 20cm, široké 3 - 10cm a báze je klínovitá. Květy mají průměr 6 - 7mm, kališní cípy jsou úzce vejčité, tupé, dlouhé 1 - 2mm a korunní lístky jsou úzce podlouhlé až jazykovité. Plodem je modře fialová bobule velikosti 4 - 7mm a obsahuje 4 - 6 semen.

Melicytus micranthus

synonyma: *Elaeodendron micranthum*

oblasti: S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo ve svazečcích, vykrajované až zubaté, občas laločnaté, dlouhé 1 - 2,5cm a na mladých exemplářích delší a užší. Kvete po 1 - 3ks drobnými úžlabními květy, korunní lístky jsou podlouhlé, 2x delší kalicha. Plodem je obvejčité až prakticky kulatá fialově červená bobule o průměru 3 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *longiusculus* - listy úzce obvejčité, podlouhlé nebo eliptické, dlouhé 1,2 - 3cm, široké 1 - 2cm; plody vejčité až prakticky kulaté, průměru 3 - 4mm

- var. *microphyllus* - severní ostrov Nového Zélandu; výška do 5m; listy obvejčité až kulaté, zpravidla prakticky celokrajné, dlouhé 2 - 9mm a široké 2 - 5mm; plody vejčité průměru 4 - 6mm

Melicytus novae-zelandiae

synonyma: *Hymenanthera novae-zelandiae*, *Scaevola nova-zelandiae*, *Scaevola novae-zelandiae*

oblasti: JV Austrálie, Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě a Ostrově Lorda Howa v podobě dvoudomého keře. Dorůstá výšky 3m. Listy jsou vejčité až podlouhlé, vykrajovaně pilovité, dlouhé 4 - 10cm a síťnatě žilkované. Kvete ve svazečcích a vlastní květy mají průměr 2 - 3mm. Plodem je fialově červená bobule. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *centurionis* - Ostrov Lorda Howa; výška do 5m; listy eliptické, dlouhé 4 - 7cm a široké 1,5 - 2,7cm; květy ve svazečcích, žlutozelené, dlouhé 2mm; plodem je kulatá růžově fialová bobule průměru 6mm

- subsp. *nova-zelandiae* - Nový Zéland

Melicytus obovatus

synonyma: *Hymenanthera obovata*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě.

Melicytus ramiflorus

synonyma: *M. umbellatus*, *Tachites umbellatus*

oblasti: Melanésie, Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě, Norfolk, Fidži, Samoa a Tonga v podobě opadavého keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 10m při průměru kmene až 60cm. Borka je šedobílá. Listy jsou střídavé, podlouhlé až kopinaté, hrubě pilovité, tmavě zelené, dlouhé 5 - 15cm, široké 3 - 5cm a mají 1,5 - 2cm stopku. Kvete v 2 - 10tičetných svazečcích na kolénkách 2letých větví na 0,5 - 1cm stopce žlutozelenými až nažloutlými květy o průměru 3 - 4 (i 5)mm a korunní lístky jsou tupé. Plodem je obvejčitá až prakticky kulatá bobule průměru 5mm a obsahuje 3 - 6 semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *fastigiata* - Fidži

- subsp. *oblongifolius* - Norfolk

- subsp. *ramiflorus* - Nový Zéland

- subsp. *samoensis* - Samoa a Tonga

Melicytus samoensis

oblasti: Tichý oceán

Roste na ostrovech Samoa a Tonga.

Melicytus ×ramilanceolatus

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2516>

<https://www.rostliny.net/>