

Litsea akoensis

synonyma: *Actinodaphne akoensis*, *Cylicodaphne akoensis*, *L. var. akoensis*, *Tetradenia akoensis*

čeleď: Lauraceae

oblasti: JV Čína, Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě stálezeleného stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, úzce obvejčité až eliptické, kopinaté (i obkopinaté), tupé až zašpičatělé, dlouhé 5 - 15cm, široké 2 - 4cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství tvoří 1 - 3 úžlabní 4 - 5tkvěté okolíky, vlastní květy mají 0,6 - 1,5cm stopku a koruna má 5 - 6 (i 8) vejčitých cípů. Plodem je podlouhlá bobule délky 1cm a šířky 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *akoensis*/*Actinodaphne akoensis*/*Cylicodaphne akoensis*/*Tetradenia akoensis* - listy úzce obvejčité až úzce eliptické, na horní straně pouze na bázi centrální žilky ochlupené, dlouhé 6 - 10cm, široké 2 - 4cm, na spodní straně podél žilek ochlupené; koruna má 6 (i 7 - 8) cípů
- var. *sasakii*/*L. linii*/*L. sasakii*/*Actinodaphne sasakii*/*Fiwa sasakii* - listy eliptické, podlouhlé nebo kopinaté (i obkopinaté), na spodní straně podél žilek ochlupené a řapíky dlouhé 1 - 1,5cm; květy mají 5 - 6 cípů

<https://www.rostliny.net/>