

Tinospora crispa (Chebule kadeřavá)

synonyma: Chasmanthera crispa, Cocculus bantamensis, Cocculus crispus, Cocculus rimosus, Cocculus verrucosus, Menispermum bantamense, Menispermum crispum, Menispermum rimosum, Menispermum tuberculatum, Menispermum verrucosum, Tinospora gibbericaulis, Tinospora mastersii, Tinospora rumphii, Tinospora thorelii, Tinospora tuberculata, Tinospora verrucosa

čeleď: Menispermaceae

oblasti: Čína, Jáva, Malajsie, Myanmar (Barma), Thajsko, Západní Bengálsko

Roste v Číně, Indii, Myanmaru, Thajsku, Malajsii a Jávě v podobě opadavého ovíjivého keře. Dorůstá výšky až 15m. Kmínky jsou později hrboilaté a obsahují hořkou mléčnou tekutinu. Listy jsou široce vejčité až kulaté, zašpičatělé, dlouhé 6 - 13 (i 25)cm, široké 6 - 13 (i 24)cm, báze srdčitá, dlanitě 5 - 7mižilná a řapíky jsou dlouhé 5 - 15 (i 30)cm. Samčí květenství je dlouhé 5 - 20cm, vlastní květy jsou seskupené po 1 - 3ks, mají 6 kališních lístků, vnější 3 jsou vejčité, dlouhé 1 - 1,5mm, vnitřní obvejčité, dlouhé 3 - 4mm, korunních lístků je 3 - 6, jsou žluté, obvejčitě lopatkovité, samičí květenství se podobá samčímu, je dlouhé 2 - 6cm a květy mají kališní i korunní lístky stejné jako samčí. Plodem je oranžová eliptická peckovice délky 2cm.

<https://www.rostliny.net/>