

Tinospora glabra

synonyma: Chasmanthera cordifolia, Cocculus convolvulaceus, Cocculus cordifolius, Menispermum glabrum, Tinospora andamanica, Tinospora reticulata, Tinospora uliginosa

čeleď: Menispermaceae

oblasti: Jáva, Malé Sundry, Melanésie, Nová Guinea

Roste v jihovýchodní Asii a na Moluckých ostrovech v podobě šplhavého keře. Kmínky jsou později bradavičnaté a borka papírová. Listy jsou vejčité, zašpičatělé, oboustranně síťnaté, dlouhé 7 - 15cm, široké 5 - 13cm, báze je srdčitá až uťatá se zakulacenými až zašpičatělými laloky a řapíky jsou dlouhé 4 - 12cm. Samčí květenství je úžlabní anebo na starších bezlistých kmíncích, úzké, řídké, dlouhé 10 - 20cm, ve spodní 1/3 - 1/2 max. řídké, vlastní květy vyrůstají v 1 - 5tičetných svazečcích v úžlabí šídlových listenů s délkou 1mm, samčí květy mají 0,8 - 1,2cm stopku, kališní lístky žluté, nazelenalé nebo bílé, vnější 3 jsou úzce vejčité, dlouhé 1mm, vnitřní široce eliptické, dlouhé 4 - 5mm, korunních lístků je 6, jsou široce klínovitě obvejčité, dlouhé 2 - 3mm, samičí květenství je dlouhé až 35cm, vlastní květy mají vnitřní kališní lístky dlouhé 3mm a ostatní je podobné samčím. Plodem je červená peckovice.

<https://www.rostliny.net/>