

Tinospora merrilliana

synonyma: *Fawcettia merrilliana*, *Parabaena amplifolia*, *Tinospora negrotica*

čeleď: Menispermaceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Sulawesi (Celebes)

Roste na Borneu, Filipínách a Sulawesi v podobě úzkého popínavého keře. Kmínky mají šířku do 1 cm, v mládí jsou ochlupené, později s korkovitými lenticelami. Listy jsou vejčité až 3úhlé, zašpičatělé, dlouhé 7 - 22 cm, široké 3 - 17 cm, báze je uťatá až hluboce srdčitá nebo hrálovitá se špičatými laloky, žilnatina dlanitě 5 - 7mižilná a řapíky jsou dlouhé 2 - 9 cm. Samčí květenství je úžlabní, může vyrůstat i po několika ks, dlouhé 5 - 16 cm, drobně ochlupené, vlastní květy mají 1 - 5 mm stopku, kališní lístky světle zelené, mohou být řídce ochlupené, vnější 3 vejčité, dlouhé 0,5 - 1,5 mm, vnitřní 3 obvejčité až lopatkovité, dlouhé 1,5 - 2,5 mm, korunních lístků je 6 a délky 1,5 mm. Plodenství je dlouhé až 40 cm na až 23 cm stopce a vlastním plodem je bílá nebo narůžovělá peckovice.

<https://www.rostliny.net/>