

Tinospora subcordata

synonyma: *Hypsipodes subcordata*, *Tinospora polygonoides*

čeleď: Menispermaceae

oblasti: Malé Sundy, Melanésie, Nová Guinea

Roste na Malých Sundách, Moluckých ostrovech a Nové Guineji v podobě nízkého šplhavého keře. Kmínky jsou později drobně bradavčité. Listy jsou 3úhlé, špičaté, oboustranně síťnaté, dlouhé 6 - 10cm, široké 4 - 9cm, báze je široce srdčitá až uťatá se zakulacenými až téměř hrálovitými laloky a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 9cm. Samčí květenství je úžlabní, vyrůstá po 1 - 3ks, dlouhé 5 - 15cm, v horní 1/2 se svazečky 3 - 4ks květů na 4 - 5mm stopce, kališní lístky jsou bílé, vnější 3 vejčité, dlouhé 1 - 1,5mm, vnitřní 3 eliptické, dlouhé 4mm, korunních lístků je 6, jsou obvejčitě klínovité, dlouhé 4mm, samičí květy vyrůstají samostatně na 4 - 6mm stopce, kališní i korunní lístky jsou podobné samčím, ale mírně menší. Plodenství je hroznovité, dlouhé 7 - 9cm a plodem je červená peckovice.

<https://www.rostliny.net/>