

Macroptilium atropurpureum

synonyma: Dolichos rhynchosioides, Phaseolus affinis, Phaseolus atropurpureus, Phaseolus atropurpureus var. canescens, Phaseolus atropurpureus var. pseuderythroloma, Phaseolus atropurpureus var. sericeus, Phaseolus atropurpureus var. vestitus, Phaseolus canescens, Phaseolus dysophyllus, Phaseolus schiedeanus, Phaseolus semierectus var. atropurpureus, Phaseolus vestitus

čeleď: Fabaceae

oblasti: Arizona, Austrálie, Brazílie, Florida, Guatemala, Havajské ostrovy, J Čína, JV Čína, Kuba, Madagaskar, Mexiko, Portoriko, S Jižní Amerika, Tchaj-wan, Texas

Roste od USA přes Karibik po sever Jižní Ameriky v podobě vytrvalé liány, ale rozšířil se i jinde. Listy jsou 3četné, řapíkaté, vlastní lístky jsou oboustranně ochlupené, dlouhé 2 - 7cm, široké 1,5 - 5cm, postranní jsou vejčité až úzce eliptické, tupé, zpravidla s 1 - 2ma laloky na vnějším okraji, centrální lístek je eliptický až kosočtvercovitý a zpravidla s 1 párem laloku. Květenství je dlouhé až 30cm, listeny jsou úzce vejčité, špičaté, dlouhé 1 - 1,5mm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, kalich zvonkovitý, ochlupený, trubka je dlouhá 4mm, zuby kopinaté, nestejně, dlouhé 2mm, křídla jsou delší pavézy i člunku, tmavě červená až černě fialová, pavéza je obvejčitá, ohrnutá, žlutě zelená, nafialovělá, člunek je malý a růžový. Plodem je ochlupený lusk délky 7 - 10cm a šířky 2 - 4mm.

Vyhovují mu smíšené suché lesy.

<https://www.rostliny.net/>