

Neslia paniculata (Řepinka latnatá)

synonyma: *Myagrum paniculatum*, *Vogelia paniculata*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Asie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Dakota, Katalánsko, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Vermont, Washington, Wisconsin, Yukon

Roste v Evropě a Asii. Patří mezi jednoletky. Kořen je vřetenitý. Dorůstá výšky 15 - 50 (i 80)cm. Příčný stonek je při bázi ochlupený, větví se až v polovině. Listy jsou kopinaté se špičkou, bazální dlouhé 5 - 13cm, široké 1 - 2,5cm, v horní části přisedlé, dlouhé 3 - 7cm, jsou i ochlupené, báze střelovitá a objímavá. Kvete žlutými květy o průměru 2 - 6mm v bohaté latě, kališní lístky jsou dlouhé 2 - 3mm a korunní lístky jsou dlouhé 3,5 - 4mm a široké 1mm. Plody jsou kulaté šešulky délky 3 - 2,5mm a šířky 1 - 2mm. Na jediné rostlině jich může být 20 - 250ks. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *paniculata* (Řepinka latnatá pravá)
- subsp. *thracica*

Vyhovuje jí teplo, hlinité půdy, spraše, okraje silnic, pole, atp.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>