

Maesa (Nákule)

čeleď: Primulaceae

Roste zejména v tropech Asie a tichomoří v podobě popínavého keře (i stromu). Dorůstá délky až 12m. Listy mohou být pilovité nebo zubaté. Květenství je hroznovité nebo latnaté, listence jsou 2, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich nálevkovitý, koruna je nálevkovitá, bílá anebo nažloutlá. Plodem jsou kulovité nebo vejčité peckovice nebo bobule a obsahuje mnoho drobných semen.

Maesa acuminata

Maesa acuminatissima

synonyma: *M. striata* var. *opaca*

oblasti: Guangxi, Hainan, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Hainanu a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 4)m. Listy jsou kopinaté, zašpičatělé až ocasovité, lesklé, dlouhé 9 - 17cm, široké 2 - 5cm, báze je tupá až prakticky kulatá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1cm. Květenství je vrcholové, latnaté, kuželovité, listence jsou kopinaté, drobné, vlastní květy mají 4 - 5mm stopku, délku 3mm, kališní cípy jsou vejčité, tupé nebo špičaté, dlouhé 0,5mm, korunní lístky jsou vejčité a stejné délky jako trubka. Plody jsou kulovité až vejčité a průměru 3mm.

Maesa alnifolia

Maesa ambigua

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 4m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou eliptické až široce obvejčité, zašpičatělé až ocasovité, hrubě pilovité, dlouhé 12 - 22cm, široké 6 - 22cm, báze je zakulacená až uťatá nebo mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Květenství je úžlabní, listeny šídlovité, dlouhé 1mm, listence úzce vejčité, vlastní květy mají 0,5 - 1mm stopku, délku 2mm, kališní lístky jsou 3úhle vejčité, dlouhé 1,5mm, koruna zvonkovitá a velikosti 2mm. Plody jsou kulovité a průměru 2mm.

Maesa ambrymensis

Maesa amplexicaulis

Maesa andamanica

oblasti: JV Asie

Maesa aneiteensis

Maesa arborea

Maesa argentea

synonyma: *Baeobotrys argentea*

oblasti: Indie, Myanmar (Barma), Nepál, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně, Indii, Myanmaru a Nepálu v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky do 8m. Větve jsou v mládí hustě ochlupené. Listy jsou vejčité až eliptické, zašpičatělé, pilovitě zubaté, dlouhé 10 - 30cm, široké 5 - 13cm, báze je špičatá, žilnatinu tvoří 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,8 - 3cm. Květenství je hroznovitě klasnaté, dlouhé 1 - 5cm, listence jsou vejčité, vlastní květy mají 0,8mm stopku, kalich kuželovitý, cípy vejčité, koruna je bílá, trubkovitě zvonkovitá, velikosti 3mm, trubka dlouhá 2mm a laloky dlouhé 1mm. Plody jsou kulovité až široce vejčité a průměru 2 - 5mm.

Maesa argyrophylla

Maesa arunachalensis

Maesa aubertii

Maesa augustini

Maesa baeobotrys

Maesa balansae

Maesa banksiana

Maesa beamanii

Maesa bengalensis

Maesa bennettii

Maesa bismarckiana

synonyma: *M. pullei*

Maesa blumei

synonyma: Baeobotrys lanceolatus

Maesa brachybotrya

Maesa brevipaniculata

synonyma: M. parvifolia var. brevipaniculata

oblasti: Guangxi, Guizhou, Yunnan

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Větve jsou v mládí hranaté a plstnaté. Listy jsou kopinaté až úzce vejčité, ocasovité, zašpičatělé, zvlněné až řídce pilovité, dlouhé 7 - 13cm, široké 1,5 - 4,5cm, báze je tupá, žilnatinu tvoří 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Květenství je latnaté, listence drobné, vlastní květy jsou bílé, aromatické, velikosti 1,5mm, mají 1,5mm stopku, kališní cípy jsou široce vejčité, koruna je zvonkovitá a 3x delší kališních cípů.

Maesa calcarea

Maesa calophylla

Maesa cambodiana

oblasti: Kambodža

Maesa canfieldiae

Maesa carolinensis

Maesa cauliflora

Maesa cavinervis

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 3 - 4m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou kopinaté, ocasovité, zašpičatělé, drobně pilovité, kožovité, dlouhé 10 - 18cm, široké 1,7 - 4cm, báze je klínovitá nebo tupá, žilnatinu tvoří 9 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je úžlabní, hroznovité nebo latnaté, dlouhé 2 - 3cm, listence vejčité, kališní cípy vytrvalé, široce 3úhlé, koruna má velikost 2mm, laloky jsou úzce eliptické a delší trubky. Plody jsou vejčité a průměru 5mm.

Maesa celebica

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Maesa chisia

synonyma: *M. dioica*, *M. prodigiosa*

oblasti: Bhútán, Indie, Myanmar (Barma), Nepál, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Nepálu a Myanmaru v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 6)m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou elipticky kopinaté až obkopinaté, ocasovité, pilovité, dlouhé 8,5 - 14cm, široké 2,5 - 5,5cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7-1,5cm. Květenství je úžlabní, latnaté, dlouhé 1,5 - 4cm, listeny jsou kopinaté, dlouhé 0,5mm a listence vejčité. Plody jsou kulovité, průměru 3 - 4mm a mají 1 - 2mm stopku.

Maesa clementis

Maesa conferta

Maesa confusa

synonyma: *M. consanguinea* var. *confusa*

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 4m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou široce eliptické až obvejčité, zašpičatělé nebo ocasovité, pilovité, dlouhé 10 - 27cm, široké 7 - 12cm, báze je tupá až široce zakulacená, žilnatinu tvoří 6 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2,8 - 4cm. Květenství je úžlabní, dlouhé 1 - 10cm, listence vejčité, vlastní květy mají 2 - 2,5mm stopku, kališní lístky vejčité, z 1/3 srostlé, koruna je bílá, dlouhá 1 - 1,4mm, laloky jsou prakticky kulaté a delší trubky. Plody jsou tmavě hnědé, kulovité a průměru do 3mm.

Maesa consanguinea

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy jsou podlouhlé až úzce vejčité, zašpičatělé, dlouhé 7 - 19cm, široké 5 - 9cm, báze je klínovitá až tupá, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5cm. Květenství je úžlabní, dlouhé 1 - 10cm a listence jsou vejčité. Plody mají 2mm stopku, jsou tmavě hnědé, kulovité a průměru 3mm.

Maesa cordifolia

Maesa corneri

Maesa corylifolia

Maesa costulata

Maesa cumingii

synonyma: *M. pachyphylla*, *M. undulata*

Maesa davaensis

Maesa decidua

Maesa decipiens

Maesa densistriata

Maesa denticulata

Maesa dependens

Maesa dubia

synonyma: *Baeobotrys dubia*, *M. canarana*

Maesa eastaneifolia

Maesa edulis

Maesa efatensis

Maesa eramangensis

Maesa ferruginea

Maesa forbesii

Maesa fraseriana

Maesa fruticosa

Maesa gaudichaudii
synonyma: M. piscatorum

Maesa glomerata

Maesa gracilis

Maesa grandiflora

Maesa grandifolia

Maesa haenkeana
synonyma: M. brunnea, M. embelioides, M. longipetiolata

Maesa haplobotrys
synonyma: M. hornsheimiana, M. klossii, M. laevigata, M. loranthifolia, M. polybotrya, M. racemosa, M. rubens, M. sogerensis, M. subsessilis, M. verrucosa

Maesa hirtella

Maesa hooglandii

Maesa hupehensis
synonyma: M. japonica var. elongata, M. wilsonii

oblasti: Hubei, Sichuan

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 4m. Listy jsou kopinaté až podlouhlé (i vejčité), zašpičatělé (i špičaté), dlouhé 10 - 21cm, široké 2 - 4,5cm, báze je zakulacená (i tupá nebo široce klínovitá), žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je úžlabní, hroznovité, dlouhé 4 - 10cm, listeny šídlovité, vlastní květy mají 3 - 4mm stopku, kališní cípy jsou vejčité, koruna je bílá, velikosti 3 - 4mm, laloky jsou široce vejčité. Plody jsou bílé nebo nažloutlé, kulovité až prakticky vejčité a průměru 5mm.

Maesa ilicifolia

Maesa impressinervis

Maesa inculticola

Maesa indica

synonyma: *Baeobotrys indica*, *Baeobotrys latifolius*, *Baeobotrys morsha*, *Baeobotrys nemoralis*, *Ehretia spicata*, *M. elmeri*, *M. elongata*, *M. grossedentata*, *M. laxa*, *M. neocoriacea*, *M. perrottetiana*, *M. ramosii*

oblasti: Himálaj, Indie, Malajsie, Malajský poloostrov, Pákistán, Srí Lanka, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, nízkém Himálaji, Indii, Srí Lance, Malajsi a Vietnamu v podobě šplhavého stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve jsou v mládí hranaté až tupě brázdité. Listy jsou široce vejčité až podlouhlé, špičaté nebo zašpičatělé, pilovitě zubaté, dlouhé (7,5 -) 8 - 15 (i 21)cm, široké (3 -) 5 - 7 (i 11)cm, báze je tupá až prakticky zakulacená a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,8 (i 2,5)cm. Květenství je vrcholové, dlouhé 3 - 5cm, listence široce vejčité, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, průměr 4 - 5mm, kališní cípy široce vejčité, koruna je bílá až světle žlutě zelená, zvonkovitá, laloky široce vejčité a min. délky trubky. Plody jsou kulovité bobule o průměru 5 - 7mm s vytrvalým kalichem.

Maesa insignis

synonyma: *M. hirsuta*

oblasti: Guangdong, Guangxi, Guizhou

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 1,2 - 4m. Povrch je ochlupený. Listy jsou eliptické nebo vejčité, ocasovité, hrubě pilovité, dlouhé 12 - 19cm, široké 4 - 7cm, báze je zakulacená nebo tupá, žilnatinu tvoří 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 1,9cm. Květenství je úžlabní, hroznovité, dlouhé 6cm, listeny kopinaté nebo šídlovité, dlouhé 1mm, vlastní květy jsou nažloutlé, velikosti 2 - 3mm, kališní laloky vejčité až prakticky 3úhlé, dlouhé 1mm, koruna zvonkovitá, laloky široce vejčité až prakticky kulaté a max. délky trubky. Plody jsou bílé, kulovité a průměru 5mm.

Maesa insularis

Maesa integrifolia

synonyma: *M. crenata*, *M. sublanceolata*

Maesa irosinensis

Maesa jaffrei

Maesa japonica

synonyma: *M. cavaleriei*, *M. coriacea*, *M. coriacea* var. *gracilis*, *M. doraena*, *M. dunniana*, *M. esquirolii*, *M. japonica* f. *gracilis*, *M. labordei*, *M. randaiensis*, *M. taiheizanensis*, *M. taiheizensis*, *Myrsine esquirolii*, *Pieris oligodonta*

oblasti: Čína, Japonsko, Vietnam

Roste v Japonsku, Číně a Vietnamu v podobě vzpřímeného (i poléhavého nebo šplhavého) keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 5m. Listy jsou eliptické až obvejčité, zašpičatělé až špičaté nebo tupé, dlouhé 5 - 16cm, široké 2 - 5cm, báze je klínovitá, tupá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 5 - 8

párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,3cm. Květenství je hroznovité nebo latnaté, listence široce vejčité nebo ledvinité, vlastní květy mají 2,5 - 3,5mm stopku, kalich délky 2mm, laloky délky 1mm, koruna je bílá, trubkovitě zvonkovitá, trubka má délku 3 - 4mm, laloky jsou ledvinité až vejčité a délky 1mm. Plody jsou kulovité nebo vejčité, dužnaté a průměru 4 - 6mm.

Maesa junghuhniana

Maesa kamerunensis

oblasti: Kamerun

Maesa kanjilalii

Maesa kerrii

Maesa kivuensis

Maesa kurzii

Maesa laevis

Maesa lanceolata

synonyma: *Baeobotrys lanceolatus*, *Baeobotrys ovata*, *Baeobotrys pictus*, *Baeobotrys rufescens*, *Embelia mildbraedii*, *M. angolensis*, *M. angustifolia*, *M. arabica*, *M. butaguensis*, *M. emirnensis*, *M. lanceolata* var. *lanceolata*, *M. lanceolata* var. *mildbraedii*, *M. mildbraedii*, *M. palustris*, *M. picta*, *M. ruwenzoriensis*, *M. trichophlebia*

oblasti: Arabský poloostrov, Madagaskar, Východní Kapsko

Roste od jihu Arabského poloostrova přes Madagaskar po JAR v podobě stromu s kulatou korunou, zpravidla jako pionýrská rostlina při okrajích vodních ploch. Dorůstá výšky 3 - 10m. Borka je šedá až hnědě červená, v mládí ochlupená. Listy jsou střídavé, kopinaté, eliptické nebo mírně vejčité, oboustranně zúžené, zubaté (i celokrajné), lesklé, zelené, dlouhé 4 - 17cm, široké 2,5 - 13cm, spodní strana světle zelená, ochlupená a řapíky jsou dlouhé do 3cm. Květenstvím je větvená hlávka v úžlabních listech délky 10cm, šířky 5cm, vlastní květy jsou sladce aromatické, 4 - 5tičetné, světle béžové a s 2ma listeny a kalich je vytrvalý. Plody jsou bílé nebo narůžovělé, průměru 3 - 6mm a obsahují drobná černá semena.

Maesa lancifolia

Maesa lanyuensis

Maesa latifolia

synonyma: M. ovata, M. pyrifolia

Maesa laxiflora

Maesa leptobotrya

Maesa leucocarpa

Maesa lineolata

Maesa lobuligera

Maesa loloruensis

Maesa longilanceolata

oblasti: Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 2 (i 5)m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou podlouhlé nebo kopinaté, ocasovité, asymetricky zubaté, dlouhé 6 - 14cm, široké 2,5 - 4,8cm, báze je široce tupá až prakticky zakulacená, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,2cm. Květenství je úžlabní, latnaté, dlouhé 3 - 7cm, listence vejčité nebo podlouhlé, délky 0,6 - 0,8mm, vlastní květy mají 1,2 - 1,5mm stopku, délku 2mm, kališní lístky jsou široce vejčité, koruna je zvonkovitá, bílá, trubka dlouhá 1,2 - 1,5mm a laloky jsou prakticky kulaté. Plody jsou kulovité nebo vejčité a průměru 3 - 4mm.

Maesa lorentziana

Maesa lutea

Maesa macilenta

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou vejčité až kopinaté, protáhlé, občas zahnuté, dlouhé 9 - 20cm, široké 3,5 - 5cm, báze uťatá až srdčitá, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je úžlabní, latnaté, dlouhé 1 - 4cm, listeny šídlovité, listence 3úhle vejčité až podlouhlé, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, délku 2mm, kališní cípy vejčité, koruna je trubkovitě zvonkovitá, a cípy 1/2 délky trubky. Plody jsou kulovité a průměru 4mm.

Maesa macilentoides

oblasti: Yunnan

Roste v Číně. Listy jsou zašpičaté až prakticky ocasovité, jemně pilovité, báze zakulacená a žilnatinu tvoří 10 - 12 párů žilek. Květenství je úžlabní, latnaté, dlouhé 0,7 - 2cm, listence vejčité, vlastní květy jsou bílé, dlouhé 2mm, mají 0,5 - 1mm stopku, kalich dlouhý 1mm, laloky široce vejčité, koruna trubkovitě zvonkovitá, laloky vejčité až prakticky ledvinité a kratší trubky. Plody jsou kulovité, dužnaté a široké 4mm.

Maesa macrocarpa

synonyma: *M. subcaudata*

Maesa macrophylla

synonyma: *Baeobotrys bogota*, *Baeobotrys macrophylla*, *Baeobotrys tomentosus*, *M. tomentosa*

oblasti: Bhútán, Západní Bengálsko

Roste v Bhútánu a Indii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 4m. Větve jsou jemně ochlupené. Listy jsou eliptické, vejčité nebo obvejčité, špičaté, zašpičaté nebo tupé, zubaté nebo pilovité, dlouhé 10 - 18cm, široké 6 - 14cm, báze je zakulacená až mělce srdčitá, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3,5cm. Květenstvím je lata délky 7 - 25cm, vlastní květy jsou bílé nebo béžové, mají 1 - 2mm stopku, kališní lístky jsou široce vejčité, dlouhé 0,8mm a koruna je dlouhá 2 - 3mm. Plody jsou kulovité velikosti 3 - 4mm.

Maesa macrothyrsa

synonyma: *M. floribunda*, *M. korthalsiana*, *M. polyantha*

Maesa malayana

Maesa manillensis

Maesa manipurensis

oblasti: Bangladéš, V Indie, Yunnan

Roste v Číně, Bangladéši a Indii v podobě keře. Dorůstá výšky 1,2 - 3m. Větve jsou v mládí mělce rýhované. Listy jsou podlouhlé až úzce kopinaté, špičaté, hrubě pilovité, dlouhé 11 - 21cm, široké 3,5 - 8cm, báze je prakticky zakulacená nebo tupá, žilnatinu tvoří 9 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,8cm. Květenství je úžlabní a vrcholové, latnaté, dlouhé 2 - 4cm, vlastní květy mají velikosti 2 - 3mm, kališní cípy jsou vejčité, koruna bílá, zvonkovitá a laloky vejčité. Plody jsou vejčité a průměru 2,5mm.

Maesa marionae

Maesa marioniae

oblasti: Myanmar (Barma), Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5 - 2 (i 5)m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou podlouhlé, eliptické nebo kopinaté, zašpičatělé až ocasovité (i špičaté), dlouhé 6 - 14cm, široké 2,5 - 4,8cm, báze je tupá až zakulacená, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1cm. Květenství je úžlabní, latnaté, dlouhé 3 - 5cm, listence vejčité, dlouhé 0,6 - 0,8mm, vlastní květy jsou bílé, dlouhé 2mm, mají 1,2 - 1,5mm stopku, kališní cípy široce vejčité, koruna zvonkovitá, laloky široce vejčité až prakticky kulaté a dlouhé 1,2mm. Plody jsou kulovité nebo vejčité a průměru 3 - 4mm.

Maesa martiana

Maesa maxima

Maesa megalobotrya

Maesa megaphylla

Maesa megistophylla

Maesa membranacea

synonyma: *Baeobotrys muscosa*, *M. muscosa*, *M. subrotunda*

oblasti: Guangxi, Hainan, Kambodža, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Kambodži a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 5m. Listy jsou široce vejčité až široce eliptické, zakulacené až uťaté, ocasovité, mírně kožovité, lesklé, dlouhé 10 - 24cm, široké 5 - 12cm, báze je tupá, zakulacená nebo uťatá, žilnatinu tvoří 6 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 4cm. Květenství je úžlabní a vrcholové, listence vejčité, vlastní květy mají 0,8 - 2mm stopku, délku 2mm a kališní cípy jsou široce vejčité. Plody jsou kulovité o průměru 3mm.

Maesa mollis

Maesa mollissima

Maesa montana

synonyma: *M. argentea* var. *kwangsiensis*, *M. castaneifolia*, *M. formosana*, *M. henryi*, *M. martini*, *M. martinii*, *M. montana* var. *elongata*, *M. montana* var. *formosana*

oblasti: Čína, Indie, Myanmar (Barma), Thajsko

Roste v Číně, Indii, Myanmaru a Thajsku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 10m. Větve

jsou v mládí plstnaté. Listy jsou eliptické, podlouhlé nebo kopinaté (i široce vejčité), špičaté nebo zašpičatělé, hrubě zubaté nebo zvlňené, dlouhé 7 - 23cm, široké 3 - 9cm, báze je klínovitá nebo tupá, žilnatinu tvoří 8 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,8cm. Květenství je úžlabní, hroznovité nebo latnaté, dlouhé 2 - 10cm, listence drobné, vlastní květy mají 1 - 3mm stopku, délku 2mm, kališní cípy vejčité nebo podlouhlé, koruna je zvonkovitá, bílá, laloky vejčité a min. délky trubky. Plody jsou bílé, kulovité nebo vejčité a průměru 3 - 4mm.

Maesa montis-wilhelmi

Maesa muelleri

Maesa muscosa

Maesa naumanniana

Maesa nayarii

Maesa nemoralis

Maesa novo-caledonica

Maesa novoguineensis

synonyma: M. warenensis

oblasti: Nová Guinea

Maesa nuda

Maesa oligodonta

Maesa oligotricha

Maesa oocarpa

Maesa ovocarpa

Maesa pahangiana

Maesa palauensis

Maesa paniculata

Maesa papuana

oblasti: Papua-Nová Guinea

Maesa parviflora

Maesa parvifolia

synonyma: *M. parvifolia* var. *parvifolia*

oblasti: Guangdong, Guangxi, Hainan, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě poléhavého keře nebo popínavky. Dorůstá délky 0,5 - 3m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou eliptické nebo vejčité, zašpičatělé (i špičaté), dlouhé 2,5 - 10cm, široké 1 - 4cm, báze je tupá až zakulacená, žilnatinu tvoří 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenství je úžlabní, latnaté, dlouhé 3 - 7cm, listence jsou kopinaté, drobné, vlastní květy jsou bílé, aromatické, mají 1,5 - 2mm stopku, kališní cípy jsou široce vejčité, koruna zvonkovitá a 3x delší kališních cípů.

Maesa pentecostes

Maesa perlaria

synonyma: *Dartus perlarius*, *M. bonii*, *M. perlaria* var. *perlaria*, *M. sinensis*, *M. sinensis* var. *glabrior*, *M. tonkinensis*

oblasti: Čína, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Thajsku a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až široce vejčité, špičaté nebo zašpičatělé, kromě báze hrubě pilovité, dlouhé 7 - 12cm, široké 3 - 6cm, báze je špičatá, žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1cm. Květenství je úžlabní, latnaté (i hroznovitě), listeny kopinaté nebo šídlovité, vlastní květy mají 1,8 - 2mm stopku, délku 2mm, kalich je plochý, laloky široce vejčité a koruna je 2x delší kališních cípů. Plody jsou kulovité o průměru 3mm.

Maesa permollis

oblasti: Laos, Myanmar (Barma), Thajsko, Yunnan

Roste v Číně, Laosu, Myanmaru a Thajsku v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 6)m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou eliptické až úzce obvejčité, špičaté, pilovité nebo zubaté, dlouhé 12 - 31cm, široké 6 - 30cm, báze je široce uťatá až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5cm. Květenství je úžlabní, listence vejčité, vlastní květy mají až 1mm stopku, jsou bílé nebo nažloutlé, dlouhé 3mm, kališní cípy vejčité, koruna trubkovitě zvonkovitá, trubka dlouhá

1,5 - 2mm, laloky jsou vejčité až prakticky kulaté a dlouhé 0,7mm. Plody jsou vejčité, ochlupené a průměru 4 - 5mm.

Maesa persicaefolia

Maesa persicifolia

synonyma: *M. densiflora*, *M. parksii*

Maesa pickeringii

Maesa pipericarpa

Maesa pisocarpa

Maesa platyphylla

Maesa populifolia

Maesa procera

Maesa procumbens

Maesa protracta

Maesa pubescens

synonyma: *Baeobotrys pubescens*

Maesa pulchella

Maesa purpureohirsuta

Maesa ramentacea

synonyma: *Baeobotrys acuminatus*, *Baeobotrys ramentacea*, *M. acuminata*, *M. glabra*, *M. membranifolia*, *M. missionis*, *M. philippinensis*, *M. sumatrana*

oblasti: Bangladéš, Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Kambodža, Malajsie, Vietnam

Roste v Číně, Bangladéši, Kambodži, Indonésii, Indii, Malajsii, Filipínách a Vietnamu v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky 1 - 5m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou vejčité až elipticky kopinaté,

špičaté nebo zašpičatělé, dlouhé 8 - 16cm, široké 2,5 - 5,5cm, báze je zakulacená, tupá až široce klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1cm. Květenství je úžlabní (i prakticky vrcholové), latnaté, dlouhé 4 - 10cm, listeny šídlovité nebo vejčité, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, jsou bílé, dlouhé 2mm, kališní cípy z 1/2 srostlé, koruna krátce trubkovitá a laloky mají délku trubky. Plody jsou nažloutlé, kulovité a průměru 2 - 3mm.

Maesa reflexa

Maesa regia

Maesa reinwardtii

Maesa reticulata

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stromu. Větve jsou v mládí tupě hranaté. Listy jsou široce obvejčité až eliptické, špičaté, vroubkované, dlouhé 15 - 24cm, široké 7 - 14cm, báze je zakulacená až široce tupá, žilnatinu tvoří 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3cm. Květenství je úžlabní a vlastní květy mají kališní cípy 3úhlé. Plody mají 2,5cm stopku, jsou vejčité a o průměru 5mm.

Maesa rheophytica

Maesa robinsonii

Maesa rubiginosa

Maesa ruficaulis

Maesa rufovillosa

synonyma: *M. echinotricha*

Maesa rugosa

synonyma: *M. indica* var. *retusa*, *M. rugosa* var. *griffithii*

oblasti: Indie, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně a Indii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Povrch je v mládí šupinatý. Listy jsou široce obvejčité, vejčité nebo kopinaté, ocasovité, drobně pilovité, dlouhé 6 - 20cm, široké 3 - 12,5cm, báze je široce tupá až špičatá, žilnatinu tvoří 8 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3,5cm. Květenství je úžlabní, latnaté, dlouhé 3 - 4cm, listeny jsou 3úhle vejčité, špičaté, vlastní květy béžově žluté, dlouhé 2 - 3mm, mají 1mm stopku, kalich široce vejčitý, cípy dlouhé 0,7mm, koruna zvonkovitá s laloky stejné délky jako trubka. Plody jsou vejčité a o průměru 3mm. Existují

vnitrodruhové taxony:

- var. griffithii - listy vejčité, širší a báze zakulacená
- var. rugosa - listy úzce kopinaté

Maesa salicifolia

Maesa samoana

oblasti: Tichý oceán

Maesa sarasinii

Maesa sayersii

Maesa serpentino-picta

Maesa spectabilis

Maesa stonei

Maesa striata

synonyma: M. lineata

Maesa striatocarpa

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou eliptické až obvejčité, ocasovité, dlouhé 8 - 15cm, široké 3,3 - 6cm, báze je klínovitá, zakulacená, tupá (i prakticky uťatá), žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství je úžlabní až téměř vrcholové, latnaté, listence vejčité, květy bílé na 1,3 - 1,5mm stopce, dlouhé 2mm, kališní cípy vejčité, koruna krátce zvonkovitá a laloky široce vejčité až prakticky ledvinité. Plody nažloutlé, kulovité a průměru 2 - 3mm.

Maesa subdentata

Maesa subdentata

Maesa tabacifolia

synonyma: *M. grandis*

Maesa tenera

oblasti: Guangdong

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 4m. Větve jsou v mládí hranaté a tupě zbrázděné. Listy jsou široce eliptické až vejčité, zašpičatělé, ocasovité, pilovité, dlouhé 7,5 - 11cm, široké 3,5 - 5,5cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství je úžlabní, hroznovité nebo latnaté, dlouhé 7 - 10cm, listence vejčité až kopinaté, vlastní květy mají 1,5 - 2mm stopku, délku 1,5 - 2mm, kališní cípy široce vejčité, koruna je zvonkovitá, 2x delší kalicha a laloky jsou široce vejčité. Plody jsou kulaté nebo prakticky vejčité a průměru 3mm.

Maesa tenuifolia

Maesa tetrandra

synonyma: *Baeobotrys fulvinervis*, *Baeobotrys mollis*, *Baeobotrys mollissimus*, *Baeobotrys tetrandra*, *M. amboinensis*, *M. fulvinervis*, *M. mollis*, *M. mollissima*

Maesa tomentella

Maesa tongensis

Maesa truncata

Maesa velutina

oblasti: Karnátaka, Kérala

Roste v Indii.

Maesa verrucosa

Maesa vestita

Maesa villosa

Maesa virgata

synonyma: *Baeobotrys virgatus*

Maesa vitiensis

synonyma: *M. lenticellata*, *M. neriifolia*, *M. stenophylla*

Maesa walkeri

Maesa warburgii

Maesa wardii

Maesa welwitschii

synonyma: *M. schweinfurthii*, *M. zenkeri*

Maesa ziroensis

Maesa zollingeri

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2463>

<https://www.rostliny.net/>