

Maesa lanceolata

synonyma: *Baeobotrys lanceolatus*, *Baeobotrys ovata*, *Baeobotrys pictus*, *Baeobotrys rufescens*, *Embelia mildbraedii*, *Maesa angolensis*, *Maesa angustifolia*, *Maesa arabica*, *Maesa butaguensis*, *Maesa emirnensis*, *M. var. lanceolata*, *M. var. mildbraedii*, *Maesa mildbraedii*, *Maesa palustris*, *Maesa picta*, *Maesa ruwenzoriensis*, *Maesa trichophlebia*

čeleď: Primulaceae

oblasti: Arabský poloostrov, Madagaskar, Východní Kapsko

Roste od jihu Arabského poloostrova přes Madagaskar po JAR v podobě stromu s kulatou korunou, zpravidla jako pionýrská rostlina při okrajích vodních ploch. Dorůstá výšky 3 - 10m. Borka je šedá až hnědě červená, v mládí ochlupená. Listy jsou střídavé, kopinaté, eliptické nebo mírně vejčité, oboustranně zúžené, zubaté (i celokrajné), lesklé, zelené, dlouhé 4 - 17cm, široké 2,5 - 13cm, spodní strana světle zelená, ochlupená a řapíky jsou dlouhé do 3cm. Květenstvím je větvená hlávka v úžlabních listech délky 10cm, šířky 5cm, vlastní květy jsou sladce aromatické, 4 - 5tičetné, světle béžové a s 2ma listeny a kalich je vytrvalý. Plody jsou bílé nebo narůžovělé, průměru 3 - 6mm a obsahují drobná černá semena.

<https://www.rostliny.net/>