

Bupleurum baldense (Prorostlík baldenský)

synonyma: *Bupleurum aristatum* var. *breviinvolucratum*, *Bupleurum breviinvolucratum*, *Bupleurum divaricatum*, *Bupleurum divaricatum* f. *elatus*, *Bupleurum divaricatum* f. *elegans*, *Bupleurum divaricatum* f. *giganteum*, *Bupleurum divaricatum* f. *humile*, *Bupleurum divaricatum* f. *nanum*, *Bupleurum divaricatum* f. *pseudopacum*, *Bupleurum divaricatum* subsp. *aristatum*, *Bupleurum divaricatum* subsp. *opacum*, *Bupleurum divaricatum* var. *aristatum*, *Bupleurum divaricatum* var. *elatus*, *Bupleurum heterophyllum*, *Bupleurum odontites* subsp. *opacum*, *Bupleurum odontites* var. *baldense*, *Bupleurum odontites* var. *nanum*, *Bupleurum odontites* var. *opacum*, *Bupleurum opacum*, *Bupleurum opacum* subsp. *nanum*, *Bupleurum pruinosa*, *Bupleurum variabile*, *Bupleurum variabile* var. *elegans*, *Bupleurum variabile* var. *nanum*, *Buprestis exaltata*

čeleď: Apiaceae

oblasti: Andalusie, Balkánský poloostrov, Itálie, Katalánsko

Roste jako jednoletka. Dorůstá výšky 2 - 25cm. Listy jsou dlouhé 1,3 - 8cm a široké 3 - 5mm. Květenstvím je okolík s 3 - 9ti květy. Plodem je dvounažka délky 2 - 2,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *baldense* (Prorostlík baldenský pravý)
- subsp. *gussonei* (Prorostlík baldenský Gussonův) - Itálie, Balkánský poloostrov; výška 10 - 25cm; stony přímé, hranaté, rýhované, tuhé; listy střídavé, čárkovité, zašpičatělé s osinatou špičkou, dlouhé 3 - 10cm, na bázi pochvovité, 1/2objímavé, na spodní straně nápadně 3žilné; květenství má obaly mírně eliptické, tmavězelené, zašpičatělé s osinou délky 2mm, obalíčky jsou podlouhlé, krátce osinaté a žluté

<https://www.rostliny.net/>