

Ipheion

čeleď: Amaryllidaceae

Roste v Argentině, Uruguayi a Brazílii v podobě malé cibulnaté trvalky. Listy jsou úzké. Květy jsou hvězdicovité, bledě modré až fialové. Plodem je 3komorová tobolka. Nejznámějším druhem je *I. uniflorum*. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Jessie' - výška 10 - 15cm; květy modré
- 'Tessa' - výška 10 - 15cm; květy růžové

Vyhovuje mu toulavý stín a chráněné místo.

Množí se dceřinými cibulkami.

Ipheion sessile

synonyma: *Beauverdia recurvifolia*, *Brodiaea leichtlinii*, *Brodiaea recurvifolia*, *Brodiaea sessiliflora*, *Brodiaea sessilis*, *Hookera sessilis*, *I. recurvifolium*, *Milla leichtlinii*

Ipheion tweedieanum

synonyma: *Beauverdia tweedieana*, *Brodiaea tweedieana*, *Brodiaea uniflora* var. *tweedieana*, *Milla tweedieana*, *Milla uniflora* var. *tweedieana*, *Tristagma tweedieana*, *Tristagma tweedieanum*

Ipheion uniflorum

synonyma: *Beauverdia uniflora*, *Beauverdia uniflora* f. *alba*, *Beauverdia uniflora* f. *roseo-plena*, *Beauverdia uniflora* f. *tenuitepala*, *Brodiaea uniflora*, *Brodiaea uniflora* var. *alba*, *Brodiaea uniflora* var. *conspicua*, *Brodiaea uniflora* var. *violacea*

oblasti: Austrálie, Buenos Aires, Francie, La Pampa, Mendoza, Nový Zéland, Rio Grande do Sul, San Luis, Uruguay, USA, Velká Británie

Roste v Argentině, Uruguayi a Brazílii jako cibulovina, jinde byla zavléčená. Listy vyrůstají z cibule, jsou trávovité až úzce řemenovité, mírně dužnaté, zelené až naředlé, lesklé, při mnutí vydávají česnekové aroma, dlouhé do 25cm a široké 8mm. Kvete na 10 - 20cm stvolu samostatnými hvězdicovitými květy podepřenými blanitým toulcem a mají 6 eliptických bělavých až nafialovělých korunních lístků. Plodem je kulovitá tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Albeerto Castillo' - výška 20cm; květy bílé, větší

Vyhovují ji traviny, okraje cest atp.

<https://www.rostliny.net/>