

Bupleurum falcatum (Prorostlík srpovitý)

synonyma: Bupleurum antiochium, Bupleurum chlorocarpum, Bupleurum corsicum, Bupleurum dilatatum, B. f. angustifolium, B. f. elatum, B. f. ellipticum, B. f. elongatum, B. f. giganteum, B. f. lato-oblongum, B. f. montenegrinum, B. f. multicaule, B. f. petiolare, B. f. polymorphum, B. f. suborbiculatum, B. f. subspathulatum, B. f. typicum, B. subsp. corsicum, B. var. angustifolium, B. var. corsicum, B. var. dilatatum, B. var. elongatum, B. var. latifolium, B. var. longiradiatum, B. var. nanum, B. var. parnassicum, B. var. petiolare, B. var. proliferum, B. var. sibthorpiatum, B. var. variifolium, Bupleurum falvatum var. stenophyllum, Bupleurum flexuosum, Bupleurum lipskyanum, Bupleurum occidentale, Bupleurum oppositifolium, Bupleurum parnassicum, Bupleurum petiolare, Bupleurum petrogenes, Bupleurum ranunculoides f. souliaei, Bupleurum rigidum var. petiolare, Bupleurum rossicum, Bupleurum sibthorpiatum, Bupleurum souliaei, Bupleurum woronowii

čeleď: Apiaceae

oblasti: Afganistán, Česká republika, J Rusko, Katalánsko, Korsika, Pákistán, Polsko, Švýcarsko, Z Asie

Roste v Evropě a západní Asii. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,2 - 0,6 (i 1)m. Pod zemí vytváří vícehlavý kúlový kořen. Lodyha je vzpřímená a větvená. V horní části jsou listy přisedlé, ostatní řapíkaté, dlouze eliptické až kopistovitě, špičaté, srpovitě prohnuté, šedozelené, spodní se 7mi žilkami a horní se 7 - 9ti žilkami. Kvete žlutými květy s 5ti okvětními lístky ve složeném okolíku s 1 - 3mi listeny, 5 - 8mi paprsky a okolíčky mají 5 žilných listenů. Plodem je nažka délky 3 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. cernuum/B. exaltatum - jižní Evropa až střední Asie; polokeř; výška do 70cm; 1 i více stonků; přizemní listy čárkovité, dlouhé do 12cm, široké 2 - 3mm se 3 - 5ti žilkami, horní listy podobné, ale kratší; květenství má 3 - 5 krátkých čárkovitých listenů, 3 - 5 nestejných paprsků, okolíčky mají 5 čárkovitých listenů; plody jsou podlouhlé a dlouhé 3mm
- subsp. corsicum - endemit Korsiky
- subsp. dilatatum
- subsp. falcatum (Prorostlík srpovitý pravý)

Roste v lesích, křovinách, sušších trávnících nejlépe s vápenitou půdou na plném slunci.

<https://www.rostliny.net/>