

Vasconcellea pubescens (Horská papája)

synonyma: *Carica candamarcensis*, *Carica cestriflora*, *Carica chiriquensis*, *Carica cundinamarcensis*, *Carica pubescens*, *Papaya cestriflora*, *Papaya cundinamarcensis*, *Papaya cundinamarcensis*, *Papaya pubescens*, *Vasconcellea cestriflora*, *Vasconcellea cundinamarcensis*

čeleď: Caricaceae

oblasti: Andy, Bolívie, Kolumbie, Peru, S Čile, S Nový Zéland, Srí Lanka, Střední Čile, V Afrika

Roste v Andách od Kolumbie po Čile v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky (1,5 -) 5 - 7 (i 10)m. Vytváří 1 kmen s chocholem listů na vrcholu. Listy jsou obrysem eliptické až kulaté, 5 - 7milaločné, dlouhé 18 - 35cm, laloky jsou špičaté až zašpičatělé, na spodní straně ochlupené a řapíky jsou dlouhé 45 - 60cm. Samčí květenství je úžlabní, latnaté, má 4 - 14cm stopku, vlastní květy jsou dlouhé 2,4 - 2,7cm, kalich má délku 2 - 3mm, korunní trubka je dlouhá 1,2 - 1,5cm, samičí květenství je 4 - 6tikvěté, má 0,7 - 1cm stopku, vlastní květy jsou bělavé až žlutě zelené, kalich je dlouhý 2 - 4mm, koruna může být ochlupená, korunní lístky jsou dlouhé 2 - 2,5cm a mohou být vně ochlupené. Jeden strom dokáže vytvořit 50 - 60 plodů. Plodem jsou jedlé obvejčité, žluté až oranžové bobule délky 6 - 15cm, šířky 3 - 8cm a mají 5 podélných žeber. Chuťově se podobají C. papaya.

Vyhovují ji dobře propustné půdy s pH (4,5 -) 6,5 - 7 (i 8,4), teploty 10 - 28°C a odumírá při poklesu pod 2°C.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>