

Bupleurum ranunculoides (Prorostlík pryskyřníkovitý)

synonyma: *Bupleurum baldense*, *Bupleurum burserianum*, *Bupleurum caricifolium*, *Bupleurum caricinum*, *Bupleurum gramineum*, *Bupleurum obtusatum*, *Bupleurum perrieri*, *Bupleurum ranunculiformis*, *B. f. exiguum*, *B. f. majus*, *B. subsp. orbiculatum*, *B. var. burserianum*, *B. var. elatus*, *B. var. exiguum*, *B. var. giganteum*, *B. var. humile*, *B. var. latifolium*, *B. var. obtusatum*, *B. var. orbiculatum*, *Bupleurum ranunculoideum*, *Bupleurum repens*, *Bupleurum subrubeum*

čeleď: Apiaceae

oblasti: Itálie, Katalánsko, Polsko, Švýcarsko

Pochází z hor Evropy. Dorůstá výšky 5 - 30 (i 50)cm. Listy vytvářejí přízemní růžici. Mají čárkovitý až kopinatý tvar a jsou objímavé. Kvete žlutými květy v okolíku. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *gramineum*
- subsp. *ranunculoides* (Prorostlík pryskyřníkovitý pravý)
- subsp. *telonense*

Vyhovuje mu vápencový podklad, půda bohatá na živiny, bohatá zálivka, ale na zimu sucho.

Množí se semeny nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>