

Bupleurum rotundifolium (Prorostlík okrouhlolistý)

synonyma: Bupleurum agrestinum, Bupleurum perfoliatum, Bupleurum perfoliatum var. rotundifolium, B. f. oblongum, B. var. alpinum, Diatropa rotundifolia

čeleď: Apiaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Arkansas, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Írán, Jižní Dakota, JV Evropa, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rusko, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Pochází z jihovýchodní Evropy, ale roste až po Rusko a Pákistán a dále v USA jako jednoletka nebo krátkověká trvalka. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,2 - 0,5 (i 1)m. Stonek je rozvětvený až v horní polovině a budí dojem prorůstání spodní části listů. Přízemní listy jsou kopinaté, zelené, dlouhé (2,5 -) 4 - 5 (i 10)cm, široké 2 - 5cm, mají 7 - 11 žilek, lodyžní jsou přisedlé a čepel má bohatou paprscitou žilnatinu. Kvete žlutými až žlutozelenými květy ve staženém okolíku s (2 -) 5 - 8 (i 10)ti paprsky délky 0,5 - 1cm se špičatými listeny s 5 - 9ti žilkami. Plodem je 2nažka délky 2,5 - 4mm. Patří mezi ohrožené druhy C1. Je vhodný na sušení. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Griffithii'
- 'Griffithii Decor'

Vyhovují mu vápencové kamenité půdy nebo hlinité až jílovité půdy, pole, vinice, okraje cest, atp.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>