

Martynia (Martynie)

čeleď: Martyniaceae

Roste ve střední Americe a v Karibiku v podobě popínavé jednoletky. Povrch je ochlupený. Listy jsou vstřícné, široce vejčité, 3hranné, široké až 30cm a dlanitě žilkované. Květenstvím je vrcholový nebo téměř vrcholový hrozen, vlastní květy mají kališní trubku hluboce laločnatou, laloky jsou nestejně, koruna je zvonkovitá, laloky jsou nestejně a zakulacené. Plodem je tobolka. Nejznámějším druhem je *M. annua*.

Vyhovuje jí teplé, plné slunce a vlhká dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny.

Martynia annua

synonyma: *Carpoceras longiflora*, *Disteira angulosa*, *M. angulosa*, *M. diandra*, *M. jussieui*, *M. pallida*, *Proboscidea jussiaei*

oblasti: Indie, Mexiko, Myanmar (Barma), Pákistán, Portoriko

Roste v Mexiku, střední Americe, Karibiku, Indii, Myanmaru a Pákistánu jako jednoletka. Dorůstá výšky 1 (i 1,8)m. Stonek je vzpřímený, sukulentní a větvený. Povrch je ochlupený. Listy jsou vstřícné, vejčité, řidčeji zubaté, dlouhé (7 -) 8 - 15 (i 20)cm, široké (6 -) 7 - 19 (i 20)cm, báze srdčitá, žilnatina dlanitá, řapíky jsou červené a mírně kratší čepele. Kvete trubkovitými světle růžovými 5tilaločnými květy na 1,5 (za plodu 3)cm stopce, na vnitřní straně i červená, modrá nebo žlutá a laloky mají růžově fialovou skvrnu. Plodem jsou černé vejčité 2komorové ochlupené tobolky délky 3cm, na vrcholu s hákovitým trnem.

Martynia louisiana

Martynia palmeri

<https://www.rostliny.net/>