

# Saurauia griffithii

synonyma: *S. var. griffithii*

čeleď: Actinidiaceae

oblasti: Bhútán, Sikkim, Vietnam, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Bhútánu, Indii a Vietnamu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 8m. Listy jsou úzce eliptické až obvejčité, zašpičatělé nebo tupé s krátkým hrotem, řídce štětinatě pilovité, kožovité, dlouhé 20 - 45cm, široké 8 - 18cm, báze je tupá až zakulacená, může být zkosená, spodní strana plstnatá, žilnatinu tvoří 37 - 40 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4,5 - 7cm. Květenství je plstnaté, řídce šupinaté, dlouhé 15 - 40cm, má 1 - 1,7cm stopku, 2 úzce eliptické listence délky 8mm, šířky 3mm, kališní lístky eliptické, dlouhé 6mm, široké 4mm, spodní strana plstnatá, korunní lístky světle růžově fialové, obvejčité, dlouhé 8mm a široké 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *annamica* - Xizang, Vietnam; listy úzce eliptické, tupé až zakulacené, zkosené, dlouhé 20 - 30cm a široké 8 - 11cm; květenství řídce plstnaté
- var. *griffithii* - Xizang, Bhútán, Sikkim; listy eliptické, dlouhé 40cm, široké 17cm, báze zakulacená, spodní strana plstnatá; květenství hustě plstnaté

<https://www.rostliny.net/>