

# Brassaiopsis glomerulata

synonyma: *Acanthopanax esquirolii*, *Aralia glomerulata*, *Brassaiopsis acuminata*, *Brassaiopsis coriacea*, *Brassaiopsis cyrtostyla*, *Brassaiopsis floribunda*, *B. var. angustifolia*, *B. var. brevipedicellata*, *B. var. coriacea*, *B. var. hirta*, *B. var. longipedicellata*, *B. var. rufostellata*, *B. var. serrata*, *B. var. subovata*, *Brassaiopsis liana*, *Brassaiopsis speciosa*, *Brassaiopsis speciosa var. hirta*, *Brassaiopsis speciosa var. rufostellata*, *Brassaiopsis speciosa var. serrata*, *Brassaiopsis speciosa var. subovata*, *Brassaiopsis speciosa var. typica*, *Gastonia candollei*, *Gastonia dentata*, *Gastonia longifolia*, *Hedera floribunda*, *Hedera glomerulata*, *Hedera wallichiana*, *Macropanax cyrtostylum*, *Macropanax glomerulatus*, *Panax digitatus*, *Paratropia floribunda*, *Schefflera thorelli*

čeleď: Araliaceae

oblasti: Indie, JZ Čína

Roste v Indii a Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 10m. Kmen je ostnitý. Větve jsou na vrcholcích ostnité a v mládí plstnaté. Listy jsou seskupené na koncích větví, dlanité s 5 - 9ti lístky, řapíčky dlouhé 25 - 60cm s bazální pochvou se 2ma jehličkovitými palisty, vlastní lístky jsou úzce eliptické až vejčité, zašpičatělé, drobně pilovité, dlouhé 15 - 48cm, široké 6 - 22cm, báze je široce klínovitá nebo zakulacená, zejména spodní strana ochlupená a řapíčky jsou dlouhé 8 - 10cm. Květenstvím je lata délky 30 - 60cm, větve délky 20 - 30cm, okolíčky jsou hroznovité na 2 - 5cm stopce, listeny zpravidla vytrvalé, bohaté, kopinaté, dlouhé 5mm, okolíčky 25 - 35tkvěté, vlastní květy mají 1 - 1,3cm stopku, kalich drobně 5tízubý, korunních lístků 5, jsou 3úhlé až vejčité, nazelenalé a dlouhé 3 - 4mm. Plody jsou kulovité, dlouhé 6 - 7mm a mají vytrvalý kalich. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *glomerulata* - listy i laty holé

- var. *rufo-stellata* - spodní strana listů a laty hustě nahnědle hvězdovitě ochlupené

<https://www.rostliny.net/>