

# Hieracium racemosum (Jestřábník hroznatý)

synonyma: Hieracium barbatum, Hieracium boreale subsp. depauperatum, Hieracium corymbuliferum, Hieracium lactucaceum

čeleď: Asteraceae

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Švýcarsko

Dorůstá výšky 10 - 80cm. Dolní nebo střední lodyžní listy bývají růžicovitě seskupené a velké, k vrcholu se náhle zmenšují a jsou od sebe oddálené. Květenstvím je úbor v hroznu, zákrovní listeny jsou zelené nebo široce zeleně lemované. Plodem je slámově žlutá, šedá nebo bleděhnědá nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. ageratoides
- subsp. alismatifolium
- subsp. anisophyllum
- subsp. apenninum
- subsp. barbatum
- subsp. barbicaule
- subsp. caramanicum - endemit Itálie
- subsp. crinitum
- subsp. eriopus
- subsp. hervieri
- subsp. heterospermum
- subsp. insulare
- subsp. italicum
- subsp. leiopsis
- subsp. limbarae - endemit Itálie
- subsp. moesiacum
- subsp. niveobarbatum
- subsp. oliastrae - endemit Itálie
- subsp. pignattianum - endemit Itálie
- subsp. provinciale
- subsp. pulmonariifolium - endemit Itálie
- subsp. racemosum
- subsp. restoniacanum
- subsp. semigrisescens
- subsp. stiriacum
- subsp. subartvinense
- subsp. subhirsutum
- subsp. sublateriflorum
- subsp. substramineum - endemit Itálie
- subsp. tenuifolium
- subsp. virgaurea

Vyhovují mu světlé teplé lesy, jejich okraje a křoviny.

<https://www.rostliny.net/>