

Belamcanda chinensis (Angínovník)

čeleď: Iridaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, JV Asie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v jihovýchodní Asii jako krátkověká trvalka. Dorůstá výšky 0,6 - 0,9 (i 1)m. Pod zemí vytváří slabý větvený oddenek. Listy jsou mečovité, vějířovité, dlouhé 30 - 45cm a široké 3,5cm. Květenství je každým rokem zvětšující se od spodní strany rozvíjející se lata, vlastní květy jsou 6tičetné, oranžové, červeně skvrnitě nebo pruhované (i žluté nebo červené) a průměru až 5cm. Plodem je tobolka obsahující 2 řady černých semen. Využívá se v léčitelství.

Vyhovuje ji obyčejná půda a plné slunce a v době vegetace bohatá zálivka. Občas dokáže za suchého zimování vydržet i venku, měl by odolat až -15°C, ale jistější je rostlinu přenést do teplot 8 - 15°C. Snáší ústřední topení a není náročná na ošetření ani na půdu.

Množí se dělením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>