

Deppea

synonyma: Choristes, Schenckia

čeleď: Rubiaceae

Roste od Mexika po Brazílii a Argentinu v podobě ochlupeného keře. Palisty jsou drobné a opadavé. Listy jsou vstřícné a řapíkaté. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholový vrcholík nebo okolík, občas i samostatné květy v paždí listů, vlastní květy jsou malé, žluté, stopkaté, kalich 4laločný, laloky mohou být nestejně, koruna je kolovitá, nálevkovitá, okraj 4laločný a 4 tyčinky. Plodem je malá obkuželovitá až obvejčitá, kožovitá nebo papírovitá žebernatá tobolka obsahující mnoho drobných prakticky kulatých semen. Nejznámějším druhem je *D. splendens*.

Deppea amaranthina

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale v podobě keře. Větvě jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčitě kulaté, kosočtvercovitě vejčité až prakticky kulaté, zakulacené nebo tupé, řídce ochlupené, dlouhé 7 - 10cm, široké 4 - 8cm, báze je zakulacená až široce klínovitá, náhle sbíhavá a řapíky jsou dlouhé 1 - 3,5cm. Květenství je vrcholičnatě volně řídce latnaté, dlouhé do 4cm, vlastní květy mají 3 - 6mm stopku, kališní lístky jsou úzce šídlovité a dlouhé 2mm. Plodem je eliptická max. řídce ochlupená mírně žebernatá tobolka délky 5mm, šířky 3mm s tupou bází.

Deppea amaranthoides

Deppea anisophylla

synonyma: Deppeopsis anisophylla

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale v podobě úzkého keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Větvě jsou v mládí krátce ochlupené. Listy jsou párovité, eliptické až kopinaté, zašpičatělé, velké listy 2 - 4x delší než krátké, dlouhé 6 - 10cm, široké 1,5 - 3cm a řapíky jsou dlouhé do 2cm. Květenství je chudé, jednostranné, dlouhé 1,5 - 3cm, vlastní květy stopkaté, kalich k bázi rozeklaný, laloky mírně nestejně, čárkovité, dlouhé 1mm, koruna kolovitá, dlouhá 2,5 - 3mm, prakticky k bázi rozeklaná na 4 kopinaté špičaté laloky délky 2,2 - 2,5mm. Plodem je úzce obvejčitá síťnatá tobolka délky 2,5 - 3,5mm.

Deppea arachnipoda

synonyma: Hoffmannia arachnipoda

Deppea blumenaviensis

synonyma: Schenckia blumenaviensis, Schenckia blumenaviensis var. macrocarpa

Deppea chimalaparum

Deppea cornifolia

synonyma: Choristes carnifolia, Rondeletia cornifolia

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou tlusté, našedlé a v mládí mohou být řídce ochlupené. Palisty jsou drobné. Listy jsou vejčité až vejčitě kopinaté, špičaté až zašpičatělé, zelené, mohou být řídce ochlupené, žilnatina zapuštěná, dlouhé 1,5 - 4,2cm, široké 0,7 - 2cm, báze je špičatá nebo zakulacená a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství je vrcholové, vrcholičnatě chocholičnaté, chudé, má 1cm stopku, vlastní květy mají kališní laloky úzce 3úhlé, špičaté, drobně ochlupené, max. 1/2 délky trubky, koruna je dlouhá 0,8 - 1,1cm, laloky jsou podlouhlé až eliptické a špičaté až zašpičatělé. Plodem je žebernatá tobolka délky 3,5mm.

Deppea densiflora

Deppea ehrenbergii

Deppea erythrorhiza

synonyma: D. hedyotideia

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku v podobě úzkého keře. Větve bývají hnědě šedé. Palisty jsou drobné. Listy jsou eliptické až vejčité, špičaté nebo zašpičatělé, zelené, dlouhé 4 - 7cm, široké 1 - 2,5cm, báze je špičatá nebo zašpičatělá, spodní strana světlejší a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je vrcholičnaté, bohaté, dlouze stopkaté, vlastní květy mají 0,4 - 1,2cm stopku, kališní laloky 3úhlé, koruna je dlouhá 2,5mm, trubka krátká, laloky jsou podlouhlé a špičaté.

Deppea foliosa

synonyma: Deppeopsis foliosa

Deppea grandiflora

synonyma: D. costaricensis, D. floribunda, D. longifolia, D. longipes

oblasti: Guatemala, J Mexiko, Panama

Roste od Mexika po Panamu v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky 1 - 2 (i 6)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou drobné a široce 3úhlé. Listy jsou obkopinaté až vejčité nebo úzce eliptické, zašpičatělé až protáhlé, mohou být řídce ochlupené, dlouhé 5 - 15cm, široké 1,5 - 6,5cm, báze je špičatá až protáhlá, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 4cm. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, zpravidla bohaté, dlouze stopkaté, vlastní květy mají 1 - 6mm stopku, kališní laloky malé, 3úhlé, špičaté, koruna je žlutá, dlouhá 0,6 - 1cm, trubka krátká, laloky podlouhlé nebo vejčité a tupé. Plodem je obkuželovitá kožovitá tmavě hnědá tobolka délky 3 - 5mm a obsahuje drobná tmavě hnědá semena.

Deppea guerrerensis

synonyma: *Edithea guerrerensis*

Deppea hamelioides

Deppea hernandezii

synonyma: *Deppeopsis hernandezii*

Deppea hintonii

Deppea hoffmannioides

Deppea inaequalis

oblasti: Guatemala, Mexiko

Roste v Guatemale a Mexiku v podobě větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Větve jsou v mládí drobně ochlupené. Listy jsou vejčitě kopinaté až úzce kopinaté, dlouze zašpičatělé, řídce ochlupené, dlouhé 5 - 12cm, široké 2 - 4cm, báze je stažená až úzce protáhlá, spodní strana max. drobně ochlupená a řapíky jsou dlouhé do 1,2cm. Květenství je vrcholičnaté (i okolíčnaté), řídké, chudé, má 1 - 2 (i 5)cm dlouhou stopku, vlastní květy mají až 8mm stopku, kališní laloky nestejně, čárkovité až kopinaté, zelené, 1 dlouhý 1 - 2mm, ostatní 3 dlouhé 4 - 7mm, koruna je drobně řídce ochlupená a dlouhá 4mm.

Deppea keniae

Deppea martinez-calderonii

Deppea miahuatlantica

synonyma: *Edithea miahuatlanica*

Deppea microphylla

oblasti: Karibik

Roste na Trinidadu v podobě keře. Větve jsou slabé, našedlé a v mládí drobně ochlupené. Palisty jsou drobné. Listy jsou kosočtvercovitě vejčitě až eliptické, tupé, zelené, dlouhé 0,4 - 1cm, široké 2 - 5mm, báze je tupá nebo špičatá, spodní strana světle, může být řídce drobně ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5mm. Květenství je úžlabní, 1 - 2květé, dlouhé 0,4 - 1cm, vlastní květy mají kališní laloky podlouhlé až úzce vejčitě, tupé, dlouhé 1mm, koruna je dlouhá 5mm, trubka krátká, laloky podlouhlé a tupé. Plodem je kulovitě obkruželovitá tobolka délky 3mm.

Deppea nitida

Deppea oaxacana

synonyma: Edithea oaxacana

oblasti: Oaxaca

Roste v Mexiku.

Deppea obtusiflora

synonyma: Choristes obtusiflora

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku v podobě keře. Větve jsou hnědě šedé, slabé a v mládí ochlupené. Palisty jsou malé. Listy jsou eliptické až mírně vejčité, zašpičatělé, ale tupé, zelené, dlouhé 1,5 - 3cm, široké 0,7 - 1,3cm, báze je špičatá nebo dlouze zašpičatělá, spodní strana světlejší, podél žilek ochlupená a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenství je vrcholičnatě chocholičnaté, chudé, má 1cm stopku, vlastní květy mají 2 - 4mm stopku, kališní laloky úzce 3úhlé, špičaté, koruna je dlouhá 8 - 9mm, trubka krátká, laloky eliptické a zakulacené.

Deppea pauciflora

Deppea pubescens

oblasti: Guatemala, J Mexiko

Roste v Mexiku a Guatemale v podobě úzkého keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Větve jsou v mládí drobně ochlupené. Palisty jsou drobné a 3úhlé. Listy jsou vejčité až úzce kopinaté, špičaté nebo zašpičatělé, drobně ochlupené, dlouhé 3,5 - 7,5cm, široké 1,2 - 3cm, báze je špičatá, spodní strana ochlupená nebo plstnatá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenství je vrcholičnatě chocholičnaté, chudé, vlastní květy mají 2 - 5mm stopku, kališní cípy jsou vejčitě 3úhlé, tupé, koruna je dlouhá 2 - 3mm a prakticky kolovitá. Plodem je eliptická drobně ochlupená mírně žebernatá tobolka délky 3mm.

Deppea purpurascens

Deppea purpusii

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku v podobě keře. Větve jsou naředlé a v mládí drobně ochlupené. Listy jsou vejčité, špičaté, zelené, v mládí řídce ochlupené, dlouhé 2,5 - 4,5cm, široké 1,2 - 2,2cm, báze je tupá nebo zakulacená, spodní strana světlejší, drobně ochlupená, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenství je úžlabní, 1 - 2květé, za plodu dlouhé 0,7 - 1,3cm. Plodem je kulovitě obkruželovitá zprvu drobně ochlupená tobolka délky 3 - 4mm, kališní laloky jsou podlouhlé nebo eliptické, špičaté a dlouhé 2 - 3mm.

Deppea rubrinervis

Deppea rupicola

synonyma: *Edithea rupicola*

Deppea schultzei

synonyma: *Edithea floribunda*, *Edithea floribunda* subsp. *leuconeura*, *Omiltemia floribunda*

Deppea scoti

synonyma: *Bellizinca scoti*, *Omiltemia scoti*

Deppea serboi

synonyma: *Edithea serboi*

Deppea sousae

synonyma: *Edithea sousae*

Deppea splendens

synonyma: *Csapodya challengerii*, *Csapodya sousae*, *Csapodya splendens*

oblasti: Chiapas

Roste v Mexiku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3,7 - 4,6m.

Deppea tenuiflora

synonyma: *Deppeopsis tenuiflora*

Deppea tubana

synonyma: *Deppeopsis tubana*

Deppea umbellata

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku v podobě keře. Větve jsou slabé, našedlé nebo nahnědlé a v mládí ochlupené. Palisty jsou široce 3úhlé a dlouhé 1mm. Listy jsou vejčité, zašpičatělé, zelené, mohou být řídce ochlupené, dlouhé 4 - 11,5cm, široké 2 - 5cm, báze je špičatá nebo zašpičatělá, spodní strana světlejší, může být řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 2,5cm. Květenství je úžlabní, okoličnaté, zpravidla 4 - 8mikověté, má 0,3 - 1,2cm stopku, vlastní květy mají 2 - 5mm stopku, kalich má laloky úzce vejčité, špičaté nebo zašpičatělé, koruna je dlouhá 2 - 3mm, trubka krátká, laloky úzce vejčité a tupé. Plodem je obkruželovitá kulovitá tobolka průměru 2mm a obsahuje drobná hnědě černá semena.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4501>

<https://www.rostliny.net/>