

Melanoseris brunoniana

synonyma: *Cicerbita brunoniana*, *Lactuca brunoniana*, *Prenanthes alliariifolia*, *Prenanthes brunoniana*, *Prenanthes hispidula*, *Prenanthes raphanifolia*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Bhútán, Himáčalpradéš, Írán, Nepál, Pákistán, Uttarpradéš

Roste v Íránu, Afganistánu, Pákistánu, Indii, Bhútánu a Nepálu jako vzpřímená trvalka. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Stonek je od středu větvený. Přízemní listy jsou řapíkaté, srdčité, 3laločné, zakulacené až uťaté, tmavě zelené, na spodní straně světle zelené, horní jsou přisedlé a úzce kopinaté. Květenstvím je vrcholový úbor, zákrov je úzce válcovitý, dlouhý 1,1 - 1,2cm, zákrovní lístky jsou růžově fialové, vnější úzce kopinaté, dlouhé 1,5 - 2,5mm, vnitřní úzce podlouhlé, zašpičatělé, více než 3x delší než vnější, okvětní lístky jsou růžově fialové a zahnuté. Plodem je zploštělá nažka s chmýrem délky 4,5 - 7mm.

<https://www.rostliny.net/>