

Melanoseris cyanea

synonyma: *Agathyrus cyaneus*, *Chaetoseris cyanea*, *Chaetoseris cyanea* var. *khasiana*, *Chaetoseris cyanea* var. *paniculata*, *Chaetoseris hastata*, *Chaetoseris hispida*, *Chondrilla hastata*, *Cicerbita cyanea*, *Cicerbita cyanea* var. *cyanea*, *Cicerbita cyanea* var. *glandulifera*, *Cicerbita cyanea* var. *hastata*, *Cicerbita cyanea* var. *khasiana*, *Cicerbita cyanea* var. *neilgherrensis*, *Cicerbita cyanea* var. *paniculata*, *Lactuca funebris*, *Lactuca hastata*, *Lactuca hastata* var. *glandulifera*, *Lactuca hastata* var. *hastata*, *Lactuca hastata* var. *khasiana*, *Lactuca hastata* var. *paniculata*, *Melanoseris hastata*, *Melanoseris paniculata*, *Mulgedium cyaneum*, *Mulgedium neilgherrense*, *Mulgedium robustum*, *Sonchus cyaneus*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Ázad Kašmír, Bhútán, Čína, Indie, Myanmar (Barma), Nepál

Roste V Myanmaru, Nepálu, Bhútánu, Indii, Číně a Pákistánu jako vzpřímená trvalka. Dorůstá výšky i více než 1,5m. Stonek je v horní 1/2 větvený. Listy jsou ve spodní 1/2 vejčité až mírně 3úhlé, zubaté s 1 párem eliptických špičatých laloků, dlouhé 5 - 10 (i 11)cm, široké 3,5 - 8,5cm, báze je zpravidla srdčitá, řapíky jsou úzce křídlaté, dlouhé 8 - 10cm, horní lodyžní listy jsou krátce řapíkaté až přisedlé, úzce eliptické, špičaté a mělce peřeně laločnaté. Květenstvím je úbor v klasovitém květenství, zákrov je válcovitý (za plodu až zvonkovitý), dlouhý 1,3 - 1,5cm, široký 5 - 8mm, vnější zákovní listy jsou úzce vejčité až úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 3 - 6mm, střední jsou úzce vejčité, dlouhé 0,8 - 1cm, široké 1,75 - 2,5mm, vnitřní jsou řidce ochlupené, uprostřed růžově fialové, okvětních lístků je (15 -) 20 - 30ks v barvě modré až růžově fialově modré a dlouhé 5 - 7mm. Plodem je tmavě hnědá nažka délky 7 - 8mm s 2 - 3mm zobákem a chmýrem délky 6 - 7mm.

<https://www.rostliny.net/>