

Brchel (Meryta)

synonyma: Botryodendrum, Botryomeryta, Schizomeryta, Strobilopanax

čeleď: Araliaceae

Roste na tichomořských ostrovech a Nové Kaledonii, Norfolkku a Novém Zélandu v podobě stále zeleného stromu nebo keře. Listy jsou velké, jednoduché, zpravidla kožovité, dlouhé až 45cm a bývají seskupené na koncích větví. Kvete přisedlými zeleně bílými květy v letech, samčí jsou malé a samičí velké. Plody jsou dužnaté, černé a dlouhé 1,2cm.

Vyhovuje jí plné slunce nebo polostín a vlhká půda bohatá na živiny. Teplotním minimem je 5°C.

Množí se 1/2dřevitými řízkami nebo semeny.

Meryta angustifolia

synonyma: Botryodendrum angustifolium

Meryta balansae

synonyma: Meryta gracilis, Meryta microcarpa, Meryta schlechteri

Meryta brachypoda

oblasti: Tichý oceán

Roste ve Francouzské Polynésii a Hendersonově ostrově.

Meryta capitata

Meryta choristantha

oblasti: Tichý oceán

Roste ve Francouzské Polynésii.

Meryta coriacea

synonyma: Botryodendrum coriaceum

Meryta denhamii

synonyma: Aralia reticulata, Meryta macrocarpa, Meryta macrocephala, Meryta superba, Oreopanax reticulatus, Strobilopanax macrocarpus, Strobilopanax macrocephalus

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii v podobě úzkého stromu. Dorůstá výšky 6 - 10m. Listy jsou střídavé, na

mladých exemplářích čárkovité až úzce eliptické, dlouhé 15 - 30 (i 45)cm, široké 8 - 12cm, na dospělých rostlinách eliptické, kopinaté nebo obkopinaté, hrubě zakulaceně zubaté, dlouhé 0,45 - 1,2m a široké 5 - 22 (i 24)cm.

Odolává teplotám do -2°C.

Meryta drakeana

oblasti: Tichý oceán

Roste na Tahiti.

Meryta lanceolata

synonyma: Botryodendrum taitense, Neara longifolia

oblasti: Bora Bora, J Nový Zéland

Roste na Tahiti a Bora Bora.

Meryta latifolia

synonyma: Aralia macrophylla, Botryodendron latifolium, Botryodendrum latifolium

oblasti: Austrálie, Tichý oceán

Roste na Norfolkku v podobě stromu s několika větvemi. Dorůstá výšky 5 - 6m. Listy jsou obkopinaté, zašpičatělé, dlouhé 50 - 75cm, široké 25 - 30cm a báze je zúžená. Samičí květenství je vrcholové a dlouhé 10 - 15cm. Plody jsou kulaté, dlouhé 5 - 6mm a mají 5 - 6 žeber.

Snáší teploty do -2°C.

Meryta lucida

oblasti: Huahine, Raiatea, Tichý oceán

Roste ve Francouzské Polynésii.

Meryta macrophylla

synonyma: Botryodendrum macrophyllum

Meryta malietoa

Meryta mauuluulu

Meryta mauruensis

oblasti: Tichý oceán

Roste na Tahiti.

Meryta neobudica

synonyma: Strobilopanax neobudicus

Meryta oxylaena

Meryta pachycarpa

Meryta pandanicarpa

Meryta pastoralis

Meryta pauciflora

Meryta raiateensis

oblasti: Raiatea, Tichý oceán

Roste na ostrove Raiatea.

Meryta salicifolia

oblasti: Tichý oceán

Roste na Tahiti.

Meryta schizolaena

synonyma: Schizomeryta schizolaena

Meryta senfftiana

Meryta sinclairii

synonyma: Botryodendrum sinclairii

oblasti: S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě stálezeleného stromu s kulovitou korunou. Dorůstá výšky do 8 - 10m při průměru kmene do 50cm. Listy jsou podlouhlé, úzce vejčité až úzce obvejčité, lesklé, tmavě zelené, zvlněné, kožovité, dlouhé 0,6 - 1m, široké 20cm a řapíky jsou dlouhé do 35cm. Květenstvím

je vrcholová vzpřímená lata délky do 50cm, vlastní květy mají 4 zelené kališní lístky a 4 - 5 korunních. Plody jsou sukulentní, černé a dlouhé i více než 1cm.

Snáší teploty do -2°C.

Meryta sonchifolia

synonyma: *Aralia sonchifolia*

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Meryta tenuifolia

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=470>

<https://www.rostliny.net/>