

Mnesithea laevis

synonyma: *Diperium cylindricum*, *Hemarthria perforata*, *M. var. hirta*, *Ophiuros laevis*, *Ophiuros perforatus*, *Ophiuros undulatus*, *Ophiurus laevis*, *Paspalum cochinchinense*, *Rottboellia corymbosa* var. *cochinchinensis*, *Rottboellia laevis*, *Rottboellia monostachya*, *Thyridostachyum laeve*

čeleď: Poaceae

oblasti: Afganistán, Chajbar Paštúnchwá, Filipíny, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Indie, Indonésie, Japonsko, Myanmar (Barma), Paňdžáb (pakistánský), Srí Lanka, Tchaj-wan, Thajsko, Tichý oceán, Vietnam

Roste v Číně, Tchaj-wanu, Japonsku, Indii, Indonésii, Pákistánu, Afganistánu, Myanmaru, Filipínách, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu a Tichomoří jako trvalka. Dorůstá výšky 0,2 - 1m. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Listy jsou špičaté, dlouhé 3 - 25cm a široké 2 - 5mm. Květenstvím je vrcholový i úžlabní hrozen délky 5 - 15cm, klásky jsou přisedlé a dlouhé 3 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>